用藥指導單張

衛教小組

學　名：Evolocumab

商品名：REPATHA 140MG/1ML(自費)

中文名：瑞百安注射液



一、此藥品的用途是什麼？

1.對於已接受最高耐受劑量 statin，但低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）仍無法達到目標值之異合子家族性高膽固醇血症（HeFH）或動脈粥狀硬化心血管疾病（clinical ASCVD）之成人患者， Repatha 可作為飲食外的輔助治療。

2.對 statin 不耐受或禁用 statin 之原發性高膽固醇血症（異合子家族性及非家族性）或混合型血脂異常之成人患者，Repatha 可單獨使用或併用其他降血脂藥物，作為飲食外的輔助治療。 2 使用限制: Repatha 對心血管事件罹病率及死亡率的影響尚無法確定。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下:
Repatha 的建議劑量為每兩週一次 140mg 或每個月一次 420mg；這兩個劑量在臨床上效果相當。

皮下注射。

Repatha 可在腹部、大腿或上臂區域進行皮下注射。注射部位應經常變換，不可注射於觸痛、瘀青、發紅或變硬的皮膚上。Repatha 不可使用靜脈注射或肌肉注射給藥。

三、使用時我該注意的特別事項？

肝功能不全

在中度肝功能不全患者曾觀察到 evolocumab 總暴露量減少，其可能導致 LDL-C 減少的效果降低。因此，這些患者可能需要密切觀察。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02

用藥指導單張

衛教小組

學　名：Evolocumab

商品名：REPATHA 140MG/1ML(自費)

中文名：瑞百安注射液



最常通報的不良反應為鼻咽炎上呼吸道感染背痛、關節疼痛流行性感冒噁心。

最常見的注射部位反應為注射部位紅斑、注射部位疼痛及注射部位瘀青。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存在冰箱（2-8° C)。切勿冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.02