

用藥指導單張

衛教小組 DQ4710101

學名：nilotinib

商品名：TASIGNA ★ 200MG (高劑量)

中文名：泰息安膠囊 200毫克



一、此藥品的用途是什麼？

治療慢性期及加速期費城染色體 (Philadelphia chromosome) 陽性的慢性骨髓性白血病 (CML) 成年患者，且該患者至少有過一次對先前的治療 (包括 imatinib) 有抗拒性或耐受性不良的經驗。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

口服400mg，每天使用2次，2次使用的間隔約12小時，而且不應與食物一同服用。

三、使用時我該注意的特別事項？

膠囊應整顆和水吞服。服藥前至少兩小時與服藥後至少一小時內皆不得進食。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

非血液學藥物相關不良反應：最常見的為皮疹、搔癢、噁心、疲倦、頭痛、便秘及腹瀉。嚴重程度多為輕微至中度。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫保存

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師