
用藥指導單張

衛教小組 DB3620201

學　名：Aminophylline

商品名：AMINOPHYLLINE 100MG

中文名：氨基非林錠



一、此藥品的用途是什麼？

氣喘及支氣管痙攣。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

一般成人劑量：

支氣管擴張劑－慢性治療：口服，初劑量：每公斤體重相當於無水Aminophylline 18.7mg，或每天467mg(選用劑量低者)，分4 次服用；若能耐受，可每隔2~3 天增加劑量約25%，可達每天每公斤體重15.2mg 或每天1.1g(選用劑量低者)之最大限量勿須檢測血清濃度。

一般兒童劑量：

支氣管擴張劑－同一般成人劑量：若能耐受可每隔2~3 天增加劑量約25%，勿須檢測血清中濃度，可達每天最大劑量如下： 9 歲以下每公斤體重28.2mg，9 歲~12 歲每公斤體重23.5mg，12 歲~16 歲每公斤體重21.2mg。16 歲以上每公斤體重15.2mg，或每天1.1g(選用劑量低者)。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 下列檢驗對病人病情之監視特別重要：支氣管炎或氣腫病人在使用本藥前或經過一段治療時間後應做肺功能檢測以決定是否繼續投藥。對長期性的加強治療或需要較高治療劑量時，應做血清中Theophylline 濃度檢測以確定適當劑量。

2. 服用錠劑時最好伴水空腹(飯前30 分鐘至1 小時或飯後2 小時)服下以加速吸收，亦可在餐中或飯後立刻服用，以減少胃腸道之刺激。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

皮疹、蕁麻疹、頭痛、噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲於陰涼(15~30℃)乾燥避光且孩童不易取得處所。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10