用藥指導單張

衛教小組 DF15900101

學　名：Etoricoxib

商品名：YOUKOXIA 60MG

中文名：息樂炎膜衣錠60毫克



一、此藥品的用途是什麼？

骨關節炎（OA）與類風濕性關節炎（RA）之表徵與症狀的急慢性治療、治療急性痛風性關節炎、治療原發性經痛、治療僵直性脊椎炎、治療牙科手術後疼痛、治療婦科手術後疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Etoricoxib為口服用藥。

Etoricoxib可與食物併服，亦可不與食物併服。

Etoricoxib的治療療程應儘可能縮短並使用最低的有效日劑量。

骨關節炎

建議劑量為每日一次30毫克或60毫克。

類風濕性關節炎

建議劑量為每日一次60毫克或90毫克。最低有效每日劑量為60毫克。

僵直性脊椎炎

建議劑量為每日一次60毫克或90毫克。最低有效每日劑量為60毫克。

急性痛風性關節炎

建議劑量為每日一次120毫克。

Etoricoxib 120毫克應僅用於急性症狀期，治療時間不可超過八天。

原發性經痛

建議劑量為每日一次120毫克。

Etoricoxib 120毫克應僅用於急性症狀期，治療時間不可超過八天。

牙科手術後疼痛

建議劑量為每日一次90毫克；

最高劑量不得超過每日一次90毫克。最多可使用3天。

婦科手術後疼痛

建議劑量為每日一次90毫克。起始劑量應於手術前先給藥。

最高劑量不得超過每日一次120毫克。最多可使用5天。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

學　名：Etoricoxib

商品名：YOUKOXIA 60MG

中文名：息樂炎膜衣錠60毫克



懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

虛弱無力／疲倦、眩暈、下肢水腫、高血壓、消化不良、胃灼熱、噁心、頭痛、ALT升高、AST升高。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09