# 用藥指導單張

衛教小組 DC1400201

學　名：Pyridostigmine

商品名：meSTINON 60MG(重症肌無力)

中文名：美定隆糖衣錠




## 一、此藥品的用途是什麼？

重症肌無力。

## 二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
重症肌無力：每天2～4次，每次1～3錠。

## 三、使用時我該注意的特別事項？

病人患有氣喘或痙攣性氣管炎時，使用本品要特別謹慎。

## 四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

## 五、此藥會造成什麼副作用？

常見-噁心、嘔吐、腹瀉、縮瞳。

## 六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.18