用藥指導單張

衛教小組 DD15910101

學　名：Entecavir

商品名：ENVIR F.C. 0.5MG

中文名：欣?膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療有B 型肝炎病毒複製跡象之成人及2 歲以上兒童之慢性B 型肝炎患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Entecavir應空腹服用(飯前至少2小時及飯後至少2小時)。

肝臟尚具代償能力

對於未曾接受核苷抑制劑治療的成人和16歲以上青少年，治療慢性B型肝炎病毒感染的Entecavir建議劑量是0.5毫克每日一次。 對於在lamivudine治療期間有B型肝炎病毒血症跡象或已知具lamivudine或telbivudine抗藥性突變 rtM204I/V含或不含 rtL180M、rtL80I/V或rtV173L的成人和青少年中(至少16歲)，Entecavir的建議劑量是 每日一次1毫克。

肝臟功能代償不全

對於慢性B型肝炎病毒感染以及肝臟功能代償不全的成人肝病患者，Entecavir建議劑量為1毫克，每日一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. B型肝炎的嚴重急性惡化曾有患者停止抗B型肝炎治療(包括Entecavir治療)後B型肝炎急性惡化的報告。停止抗B型肝炎治療以後至少幾個月，應藉由臨床及檢驗追蹤密切監測患者的肝功能。適合的話，可能需要恢復抗B型肝炎治療。

2. 同時感染人類免疫不全病毒與B肝炎病毒的患者尚未評估使用Entecavir於同時感染HIV/HBV且未同時接受有效的HIV治療之患者身上。目前的臨床經驗告訴我們，若在未曾接受治療的HIV (人類免疫不全病毒)感染患者身上，使用Entecavir以治療其慢性B型肝炎病毒感染，則可能促成其發展出對HIV核酸反轉錄酶抑制劑之抗藥性。因此，並不建議使用 Entecavir，治療同時受到人類免疫不全病毒/B型肝炎病毒感染且並未使用HARRT 的患者。在開始進行 Entecavir 治療之前，應先對所有病患進行 HIV 抗體測試。目前未有任何試驗研究Entecavir是否可治療HIV感染，亦不建議此種用藥方式。

3. 乳酸酸血症及併發脂肪變性的嚴重肝腫大單獨使用核苷酸類似物或合併使用抗反轉錄病毒劑，均曾出現乳酸酸血症及併發脂肪變性的嚴重肝腫大，包括致命案例。大部分案例均發生於女性患者。可能的

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DD15910101

學　名：Entecavir

商品名：ENVIR F.C. 0.5MG

中文名：欣?膜衣錠



危險因子包括肥胖與過長的核酸暴露。使用核苷酸類似物於已知有任何肝病風險的患者時，應特別小心；不過，在不具已知危險因子的患者中，亦曾發生上述病症。

對於任何經由臨床或實驗室發現顯示具有乳酸酸血症或顯著肝毒性的患者(可能包括肝腫大及脂肪變性，即使未出現明顯的轉氨酶濃度上升)，應暫停Entecavir治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、頭痛、疲倦、暈眩。

六、此藥儲存時的條件為何？

請保存於30℃以下，陰涼乾燥處，及小孩接觸不到之處。

為避免藥品受潮變質，請於服用前，才將藥片從鋁箔包裝中取出。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15