

用藥指導單張

衛教小組 DD2480201

學名：Pantoprazole

商品名：PANHO ENTERIC F.C. 40MG (附報告)

中文名：盼胃好腸溶膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、中度及嚴重胃食道逆流性疾病、Zollinger-Ellison Syndrome。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人：

合併二種適當之抗微生物製劑治療與幽門螺旋桿菌相關之消化性潰瘍、胃潰瘍、十二指腸潰瘍，中度及嚴重胃食道逆流性疾病、Zollinger-Ellison Syndrome。成人建議口服劑量是40毫克(一天一次)，使用8星期。若某些患者於8星期的療程後尚未痊癒，則可以考慮另外再投予8星期的療程。

12歲以上之青少年：

中度及嚴重胃食道逆流性疾病建議口服劑量是20至40毫克(一天一次)，使用不超過8星期為原則。若某些患者於8星期的療程後尚未痊癒，則可以考慮另外再投予8星期的療程。12~18歲青少年使用超過8星期之經驗有限。

12歲以下孩童：

本品不建議使用於12歲以下孩童，因尚未建立相關資料。

本品不適合剝半或嚼碎，必須整顆吞服，可以空腹使用或飯後使用，與制酸劑合用不會影響本品的吸收。

三、使用時我該注意的特別事項？

對於Zollinger-Ellison - Syndrome及其他胃酸分泌過多情況的長期治療，應依個別臨床症狀審慎使用Pantoprazole及其他制酸劑，

因當過度抑制胃酸時會降低對維生素B12(cyanocobalamin)的吸收。Pantoprazole不適用於輕度胃腸疾病神經性胃部不適。在合併療法，應觀察個別藥物特性。使用Pantoprazole治療之前，應先確定病人沒有任何的惡性胃潰瘍或惡性食道疾病，因為Pantoprazole治療會消除惡性疾病的症狀而延誤診斷。診斷胃食道逆流性疾病須作內試鏡檢查確定。至今仍未有使用於孩童的經驗。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DD2480201

學名：Pantoprazole

商品名：PANHO ENTERIC F.C. 40MG (附報告)

中文名：盼胃好腸溶膜衣錠



B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、上腹疼痛、腹瀉、便秘或胃腸脹氣。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫(25度C以下)儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師