用藥指導單張

衛教小組 DF0550101

學　名：Febuxostat

商品名：FEBURIC 80MG

中文名：福避痛膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1.治療慢性痛風患者的高尿酸血症。不建議用於無症狀的高尿酸血症者。

2.用於因血液腫瘤接受化療，發生腫瘤溶解症後群(Tumor Lysis Syndrome)的中度至高度風險成年病人，以預防和治療高尿酸血症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1.治療痛風患者的高尿酸血症，Feburic的建議劑量是40mg或80mg每天一次。建議起始劑量是40mg每天一次。對於使用40mg二週後血清尿酸濃度(sUA)未低於6mg/dL的患者，建議使用Feburic 80mg。

2.腫瘤溶解症候群：FEBURIC的建議劑量室80mg每天一次。

FEBURIC應在細胞毒性藥物治療開始前二天開始用藥，並且繼續用藥最少7天；然而根據化療期間臨床判斷，治療可延長至9天。

服用Feburic無須顧慮食物或制酸劑的使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 降尿酸劑治療期間，觀察到可能有痛風發作，此為治療之反應。
2. 若有心血管事件、肝臟酵素升高、皮疹，請找醫師評估診治。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

肝功能異常：4.6%、皮疹：1.6%、噁心：1.3%、關節痛：0.7%。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.11