用藥指導單張

衛教小組 DA13810101

學　名：Diltiazem

商品名：PROGOR 180MG

中文名：保樂康緩釋膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

成人:

起始用量:每天180mg

維持用量:每天240mg-360mg

最高用量:每天360mg

老年或伴有肝腎疾患之患者

起始用量:每天120mg

孩童: 幼兒使用之安全性及有效性,尚待建立。

每天一次,飯前或飯中服用,每次用藥間隔24小時。

不可咬碎膠囊,應以足夠之開水吞服藥品。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、下列疾患應避免使用本品:

(1) 心跳不規則,尤其心跳速率低於50次/分

(2) 心臟疾患,無論有無肺充血

(3) 伴有併發症之心臟發作

(4) 肺部充血(與充血性心臟衰竭無關)

(5) 低血壓

(6) 中風

(7) 不穩定性心絞痛

(8) 毛地黃中毒

(9) 對Diltiazem過敏者

二、注意事項:

1. 使用Progor治療,對於正使用β-Blocker之患者、心臟病患、老年患者及其併有肝腎疾患者應注意監控。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DA13810101

學　名：Diltiazem

商品名：PROGOR 180MG

中文名：保樂康緩釋膠囊



2. 如果患者已使用Cyclosporin治療者,尤其需要特別監督使用。
3. 如果是全身麻醉時,需通知麻醉師患者服用本藥。
4. 如果腹瀉,可能會影響本膠囊所有內容物完整釋出。
5. Progor不建議用於懷孕或即將懷孕的婦女。如果哺乳期還是必須使用Progor治療,應改以他法餵食嬰兒。
6. 須小心使用,尤其是治療初期;如果需要改變治療或需要使用含酒精成份製劑,都須要定期監督Progor治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

若下列副作用發生,必須立即停藥:心臟問題、發疹、下肢腫脹,這些特殊副作用通常是不會發生的或只是暫時性的出現在高血壓病人身上。

六、此藥儲存時的條件為何？

應避濕保存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital