用藥指導單張

衛教小組 DS12980101

學　名：Potassium chloride

商品名：CONST-K 750MG(potassium 10mEq/tab)

中文名：舒補鉀持續性藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

缺鉀狀態。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

病人應坐直在飯間與液體整粒吞服。

持續性藥效錠不可壓碎、咀嚼或吸吮，進餐時以適量液體吞嚥整粒持續性藥效錠。本產品易引起胃刺激，請勿空腹服藥。

劑量:

成年病人劑量必須按照患者的個人狀況調整。

若每日劑量超過 20 mEq，則應分次服用，以免單次劑量超過 20 mEq。

治療低血鉀：一般劑量範圍為每日40-100 mEq。

預防低血鉀：一般劑量為每日20 mEq。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

口服鉀鹽最常見之不良反應有噁心、嘔吐、腸胃脹氣、腹部疼痛 / 不適與腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

25° C以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.10.25