用藥指導單張

衛教小組 DA1510101

學　名：Nimodipine

商品名：NIMOTOP 30MG(口服)

中文名：腦妥膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

預防、治療因動脈瘤引起之蜘蛛膜下出血後，腦血管痙攣所引起的缺血性神經缺損。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Nimotop靜脈輸注液輸注 5 - 14天後，建議再口服Nimotop膜衣錠7天。

一般而言，錠劑應整顆以水吞服，不需隨餐服用。禁止與葡萄柚汁併服。每次用藥的間隔時間不可少於四小時。

口服Nimotop膜衣錠是隨著Nimotop靜脈輸注液治療後使用。

劑量

除非有特殊的處方，一般建議的使用劑量如下：

建議用法是先以Nimotop靜脈輸注液輸注5 - 14天，接著再改以每天口服六次、每次兩錠Nimotop膜衣錠(6 x 60 mg nimodipine)。

若病人發生副作用，則須減低劑量或停止治療。

與CYP3A4抑制劑或CYP3A4誘導劑併用時，可能須調整劑量。

- 預防性使用

靜脈輸注治療結束後，建議使用口服Nimotop膜衣錠持續治療，一天服用六次60mg的Nimotop膜衣錠，每四小時服用一次，持續七天。

- 治療性使用

靜脈輸注治療後，建議使用口服Nimotop膜衣錠持續治療，一天服用六次60mg的Nimotop膜衣錠，每四小時服用一次，持續七天。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.雖然目前尚未顯示nimodipine治療與顱內壓升高有直接關係。當在前述病例情況下或腦組織內的水分上升時(統稱腦水腫)，建議密切監測顱內壓的變化。

2.患有低血壓(收縮壓小於100 mmHg)的病人使用時必須特別注意。

3.有不規律心絞痛或在4週內發生心肌梗塞的病患，醫生應衡量可能造成的危險性(例如：冠狀動脈灌注減少與心肌缺血)與效益(例如：

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20

用藥指導單張

衛教小組 DA1510101

學　名：Nimodipine

商品名：NIMOTOP 30MG(口服)

中文名：腦妥膜衣錠



腦灌注的改善)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛，面部潮紅，胃部症狀，嘔心，灼熱感和血壓降低。

六、此藥儲存時的條件為何？

Nimotop膜衣錠在過期後不可使用。

應將藥物置於兒童無法觸及之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.20