用藥指導單張

衛教小組 DB4900201

學　名：Bromhexine+Doxylamine+Orciprenaline

商品名：ANTICA SYRUP 120ML

中文名：伏咳糖漿



一、此藥品的用途是什麼？

支氣管氣喘、急慢性支氣管炎、肺氣腫、□痙攣性氣管炎、支氣管擴張症引起之咳嗽及喀痰。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
通常成人劑量每次口服 10 ml，一日3次。小孩6-14歲每次 5 ml，一日三-四次，1-6歲每次 5 ml，一日2-3次。

三、使用時我該注意的特別事項？

以下病症之患者小心投與：

a. 心律不整病患有心跳過速情形時。b. 充血性心力衰竭及冠狀助脈疾患。c. 糖尿病。d. 高血壓。e. 甲狀腺機能亢進。f. 青光眼。9. 前列腺肥大。h. 幽門、十二指腸阻塞或膀胱頸阻塞。i. 狹窄性消化性潰瘍。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級： 在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜眠、支氣管分泌物變濃、眩蛙，胃部不適、胃痛、口中異味感、視力模糊、排尿困難或疼痛、頭痛，噁心，嘔吐、腹瀉、心跳加速、臉頰疼痛、神經過敏、多汗、虛弱、不安、肌肉痙攣及血中氨基轉移酶增加、口鼻和喉乾燥、胃口不佳、睡眠麻煩(特別是小孩)、皮膚疹等。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03