用藥指導單張

衛教小組 DH15330101

學　名：Policresulen

商品名：poLININ VAGINAL SUPP

中文名：保理寧陰道栓劑



一、此藥品的用途是什麼？

子宮頸糜爛、子宮頸炎(含由毛滴蟲及念珠菌引起者)、陰道炎、白帶。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

婦科：每二日使用一粒本品陰道栓劑。

在燒灼術治療間隔中，如果使用policresulen濃縮液，則陰道栓劑須每二日使用一粒。為加快給藥，可先以水潤濕栓劑，病人最好以仰臥姿勢，使藥物能深入陰道中。

在夜間實行陰道給藥最適當，最好使用清潔的毛巾，可避免衣服和床單被沾污。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品栓劑會在治療過程中產生刺激作用。如果壞死組織由病灶區脫落，即使是大量時，無需驚恐。
2. 在治療期時不可用刺激性肥皂清洗或性交。
3. 與其他陰道製劑一樣，本品栓劑在月經來時不可使用。
4. 本品栓劑應避免眼部接觸。
5. 如有棉織物及皮革與本品栓劑接觸後，必須在製劑未乾前立即清洗乾淨。
6. 陰道栓劑上的斑點，是栓劑基劑產生的自然現象，不影響其使用，效果或耐受性。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

在以本品治療初期會有局部刺激作用，但通常迅速地消退。

六、此藥儲存時的條件為何？

應保存於不超過25 C的室溫中。應置放於兒童拿不到之處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.12

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital