

用藥指導單張

衛教小組 DL12940101

學名：Paliperidone

商品名：PARDONE 3MG

中文名：佩里波持續性藥效錠



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症、情感思覺失調症 (Schizoaffective disorder)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品必須整粒用水送服。不可將藥錠嚼碎、剝半或磨粉。

其藥物成分係容納在一個不可為身體吸收的外殼之內，此外殼的設計是為了以控制速率釋出藥物。藥錠的外殼與不可溶的核心組成會一併排出體外；病人如果偶爾發現糞便中有看起來像是藥錠的東西，並不須擔心。

1. 思覺失調症

成人建議劑量為每日一次，每次3 ~ 12 mg，在早晨投與。青少年（12 ~ 17 歲）建議起始劑量為每日一次，每次 3 mg。

2. 情感思覺失調症

建議劑量為 6 mg每日一次，於晨間服用。如有需要，通常應間隔 4 天以上再提高劑量。當必須提高劑量時，建議每次增加 3 mg。最高建議劑量為12 毫克/日。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 所有接受非典型抗精神病藥品之病人，應密切留意高血糖症狀(如：多食、劇渴、多尿或無力)，若出現高血糖症狀時，應立刻測量血糖值。有糖尿病或糖尿病危險因子(如：肥胖、有糖尿病家族史等)之病人，用藥前應監測血糖，用藥中也應定期監測血糖。對於出現明顯需要緊急治療高血糖的病人，應考慮停藥，有些病人停藥後仍須使用抗糖尿病藥品治療。

2. 可能會導致跌倒及因此骨折或其他跌倒相關的傷害。對於患有疾病、健康狀況或使用的藥物可能會加劇這些影響的病人（尤其是年長者），於開始抗精神病藥物治療時應評估跌倒的風險，長期接受抗精神病藥物治療的病人也應定期重複評估。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL12940101

學名：Paliperidone

商品名：PARDONE 3MG

中文名：佩里波持續性藥效錠



錐體外症狀、嗜睡、消化不良、便秘、體重增加、以及鼻咽炎。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師