


用藥指導單張

衛教小組 DF13820101

學名：Meloxicam

商品名：Meloxicam (MELOCAM 7.5MG)

中文名：美樂康錠



一、此藥品的用途是什麼？

類風濕性關節炎、骨關節炎及僵直性脊椎炎之症狀治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 風濕性關節炎：每日15mg。依據治療實際效應，劑量可減低至每日7.5mg。
2. 骨關節炎：每日7.5mg。需要時，劑量可增加至每日15mg。
3. 僵直性脊髓炎：每日15mg。
4. 有可能增加不良反應危險的病人：起始劑量為每日7.5mg。
5. 嚴重腎衰竭進行血液透析的病人：每日劑量不可超過7.5mg。
6. 每日建議最大劑量為15mg。
7. 兒童的劑量尚未建立，目前僅可使用於成人。錠劑可與水或其他液體及食物同時吞服。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. NSAIDs對曾患腸胃疾病或正在使用抗凝血劑之患者應謹慎，若發生消化性潰瘍或出血時，應停藥。年老者發生腸胃出血、潰瘍、或胃腸穿孔會較嚴重。
2. 需特別注意病人是否發生皮膚黏膜之不良反應，一旦發生應考慮停藥。
3. NSAIDs可抑制腎的前列腺素合成，前列腺素與維持腎灌注有關。當病人腎血流與血液體積減少時，若再使用任何NSAIDs，可能促使腎代償不全。停藥可恢復治療前狀態。脫水、充血性心衰竭、肝硬化、腎疾病、使用利尿劑、或手術過程使血容積過少的病人，必須小心監測排尿量及腎功能。
4. NSAIDs可能誘發鈉、鉀及水分滯留，及干擾利尿劑利尿作用。對容易罹患心衰竭或高血壓患者之病情可能加重或惡化。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DF13820101

學名：Meloxicam


商品名：Meloxicam (MELOCAM 7.5MG)

中文名：美樂康錠

消化不良、噁心、嘔吐、腹疼、便秘、氣脹、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

25° C以下儲存。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師