

用藥指導單張

衛教小組 DL16420101

學名：Aripiprazole

商品名：APRAZ ORAL SOL'N 1MG/ML, 150ML

中文名：安立舒內服液劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. 成人和青少年(13至17歲)的思覺失調症。
2. 治療小兒思覺失調症的特殊考量：兒童及青少年的精神疾患的診斷標準通常與成人不一致。建議於充分診斷及評估相關風險後再給予藥物治療。藥物治療小兒思覺失調症應僅是總體治療(包含心理、教育及社會介入)的一部分。
3. 成人和兒童(10至17歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作，可單獨使用或做為鋰鹽或Valproate的輔助治療。
4. 第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或valproate的輔助治療。
5. 重鬱症之輔助治療。
6. 兒童(6至17歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。
7. 妥瑞氏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

思覺失調症

成人 Aripiprazole的建議起始劑量與目標劑量為每日10或15毫克，一日一次，不須考慮飲食因素。經系統性評估後顯示Aripiprazole每日劑量在10~30毫克範圍內是有療效的。然而，高於每日10 ~ 15毫克的用藥量，並沒有顯示出有較佳的效果。藥效達到穩定狀態需要2週，故在服藥未達2週，不應該增加劑量。

雙極性疾患躁症發作及混合型發作之急性治療

成人：Aripiprazole單一藥物療法的建議起始劑量為15毫克/日，一日一次，而做為鋰鹽或valproate的輔助治療的建議起始劑量為10-15毫克/日，一日一次。不須考慮飲食因素。

建議的目標劑量為15毫克/日，可做為單一藥物治療或做為鋰鹽或valproate的輔助治療。劑量可依臨床反應提高至30毫克/日。30毫克/日以上之劑量的安全性尚未在臨床試驗評估過。

兒童病人：Aripiprazole做為10至17歲兒童單一藥物治療的建議起始劑量為2 毫克/日，並於2天後調整為5毫克/日，再於另外2天之後調整至10毫克/日的目標劑量。Aripiprazole做為鋰鹽或valproate的輔助治療的建議劑量與單一藥物治療相同

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL16420101

學名：Aripiprazole

商品名：APRAZ ORAL SOL'N 1MG/ML, 150ML

中文名：安立舒內服液劑



。如果有需要的話，則後續應以每次增加5毫克的方式提高劑量。使用Aripiprazole時，並不須考慮飲食因素。

重鬱症之輔助治療

成人使用Aripiprazole做為已使用抗憂鬱劑治療之病人的輔助治療用藥時，建議起始劑量為2毫克/日至5毫克/日。建議劑量範圍是2毫克/日至15毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。病人應定期接受重新評估，以確認維持治療的必要性。

自閉性疾患伴隨之急躁易怒

兒童病人(6-17歲) 兒童自閉性疾患伴隨之急躁易怒之建議劑量範圍為5毫克/日至15毫克/日。Aripiprazole的起始劑量為每日劑量2毫克，如果需要，每日劑量增加至5毫克，接著再增加至10毫克/日或15毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。病人應定期接受重新評估，以確認維持治療的必要性。

妥瑞氏症

兒童病人(6-18歲) 妥瑞氏症之建議劑量範圍為5毫克/日至20毫克/日。對於體重小於50公斤的病人，起始劑量為每日2毫克，並在兩天後達到目標劑量5毫克/日。在抽動(tics)未獲理想控制的病人，可增加劑量至10毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。對於體重大於50公斤的病人，起始劑量為2毫克/日，使用2天，之後增加劑量至5毫克/日，使用5天，目標劑量為在第8天時達10毫克/日。在抽動(tics)未獲理想控制的病人，可增加劑量至20毫克/日。應以每次不超過5毫克/日的方式逐步調整劑量，且間隔不可少於1週。

三、使用時我該注意的特別事項？

患有失智症相關精神疾病之老年病人的死亡率會升高，以及增加併服抗憂鬱藥物病人之自殺念頭與自殺行為服用抗精神病藥物的失智症相關精神疾病的老年病人，有增加死亡的風險性。

Aripiprazole並未被核准用來治療失智症相關的精神疾病。短期研究顯示抗憂鬱劑會升高兒童、青少年及年輕成人出現自殺念頭及自殺行為的風險。這些研究並未顯示對24歲以上病人使用抗憂鬱劑時出現自殺念頭與自殺行為的風險會升高；在65歲(含)以上的病人中，使用抗憂鬱劑時的風險有降低的現象。

對開始接受抗憂鬱劑治療的所有年齡層的病人，嚴密觀察是否有臨床表徵惡化、出現自殺念頭及自殺行為之緊急狀況。應告知家屬與照顧者嚴密觀察以及與處方醫師保持聯繫。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL16420101

學名：Aripiprazole

商品名：APRAZ ORAL SOL'N 1MG/ML, 150ML

中文名：安立舒內服液劑



C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠及焦躁不安。

六、此藥儲存時的條件為何？

請密封儲存於25℃以下。

開封使用90日後丟棄。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師