用藥指導單張

衛教小組 DE7590301

學　名：Potassium chloride+Riboflavin (vit B2)

商品名：POTASSIUM CHLORIDE ★ 20mEq/10ML(大包裝)(氯化鉀)

中文名：氯化鉀注射液15%



一、此藥品的用途是什麼？

治療鉀缺乏症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 限制只能靜脈滴注(IVD)使用。
2. 要稀釋於大體積輸液中使用，否則有立即死亡的危險。
3. 一般劑量為每公升靜脈點滴液中加入40mEq potassium chloride。最高濃度為80mEq/L。

三、使用時我該注意的特別事項？

以下情況要謹慎用藥，對藥物過敏、拉肚子、糖尿病、肝腎疾病等。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

胃腸障礙、出血及穿孔、高血鉀症。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19