

用藥指導單張

衛教小組

學名：Gabapentin

商品名：NEURONTIN 300MG

中文名：鎮頑癲膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法、帶狀疱疹後神經痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Gabapentin可空腹或隨餐口服。當醫師認為需要減低劑量、停藥、或改用其他抗癲癇藥品時，應當以至少一週的時間逐漸進行。癲癇：

成人及12歲以上兒童患者：有效劑量是900-1800mg/天。起始劑量是每天三次(TID)，每次300mg，或依照仿單表1調節劑量。此後，可以把劑量分成三等分，逐步調高劑量至最高劑量1800mg/天。不過長期的開放性臨床試驗顯示，當劑量達2400mg/天時，有些患者的耐受性仍然良好。每天服用三次(TID)時，劑量與劑量之間的最大間隔不應超過12小時，以免發生抽搐。

3-12歲兒童患者：Gabapentin的起始劑量是10-15mg/kg/天，分成三等分服用(每天三次)，可以用三天的時間逐步調高劑量，以達到有效劑量。對於5歲及5歲以上的兒童患者，gabapentin的有效劑量是25-35mg/kg/天，分成三等分服用(每天三次)，對於3歲至未滿5歲兒童者，gabapentin的有效劑量是40mg/kg/天，分成三等分服用(每天三次)。長期的臨床試驗顯示，當劑量高達50mg/kg/天時，患者的耐受性仍然良好。劑量與劑量之間的最大間隔不應超過12小時。

成人神經痛：起始劑量為900mg/天，分三等分服用。必要時，可根據治療反應逐步調高劑量，最高劑量為1800mg/天。

進行血液透析之患者的劑量調整：對於從未用過gabapentin，而且進行血液透析的患者，建議先給300-400mg的負荷劑量，然後在每次歷時4小時的血液透析之後給予gabapentin 200-300mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

由於已有gabapentin治療發生暈眩和嗜睡之報告應告知病人，在確定本藥不會影響他們從事此類活動的能力之前，不要開車或操作有危險性的機械。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組

學名：Gabapentin

商品名：NEURONTIN 300MG

中文名：鎮頑癲膠囊



五、此藥會造成什麼副作用？

疲倦、頭痛、噁心、嘔吐、嗜眠。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫 15°C 至 30°C 儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師