

用藥指導單張

衛教小組 DM10770101

學名：Ceftizoxime

商品名：CETICIN INJ 500MG

中文名：雪寧菌靜脈注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

通常，成人1天 0.5~2g（力價），小兒1天 40~80mg（力價）/ kg，分2~4次靜脈注射。此外，可依年齡、症狀適宜增減。重症、難治性感染時，成人可以增量至1天 4g（力價），小兒可以增量至1天 120mg（力價）/ kg。

靜脈注射時，須用注射用水、生理食鹽水或葡萄糖注射液溶解，緩慢注射。

另外，亦可加入糖質、電解質、胺基酸等製劑之輸注液內，以30 分鐘~2 小時的時間，點滴注入靜脈內。

廠商提供關於「雪寧菌靜脈注射劑500MG (Ceftizoxime)」之溶液配製方法：

1. 靜脈注射溶液配製方法：

Ceftizoxime 500mg 以注射用水 5mL，配製成濃度 95mg/mL。

2. 靜脈輸液配製方法：

將配製後的CEFTIZOXIME 溶液(95mg/mL)加入50至100毫升之生理食鹽水或5wv%葡萄糖注射液。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 一般注意事項為預測休克等的反應，要進行詳細的問診。此外，最好在用藥前做皮膚反應試驗。
2. 下列患者不要投與有過因ceftizoxime sodium 而引起休克既往歷之患者。
3. 下列患者要慎重投與
 - (1) 對penicillin 類或cephem 類藥物有過敏既往歷之患者。
 - (2) 本人、父母或兄弟姐妹間有易發支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質之患者。
 - (3) 有重度腎障礙的患者此時，因血中濃度持續較久，所以須依腎障礙之程度而減少投與量，將投與間隔延長。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DM10770101

學名：Ceftizoxime

商品名：CETICIN INJ 500MG

中文名：雪寧菌靜脈注射劑



(4) 對不能正常進食或非經口攝取營養的患者、高齡者、全身狀態不良患者。(因可能會出現維他命K 缺乏症狀，所以要嚴密觀察)。

4. 溶解後須儘快使用。必須保存時，於室溫保存下，可能會產生沉澱，所以須在7 小時內使用之，保存在冰箱內時，則須在48 小時內使用之。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

發燒、腹瀉、皮疹、蕁麻疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師