

用藥指導單張

衛教小組 DI0030101

學名：Ritodrine

商品名：aNPo 10MG (安胎)

中文名：安寶錠



一、此藥品的用途是什麼？

預防早產、流產。

說明：當受孕已超過20個星期，可用本品來治療適宜病人的早產分娩。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

開始時：0.1mg/分，靜脈滴注，每十分鐘可增加50mcg/分，至最大量為350mcg/分。分娩停止後，繼續滴注12小時。在終止滴注前30分，口服投與10mg，然後每2小時10mg，共24小時，然後4~6小時10~20mg，視需要，而長時間投與。最大口服劑量為120mg/日。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 密切監視母親脈搏速度及血壓，和胎兒的心跳速度，並觀察母親肺水腫的指示(胸痛，呼吸困難，出汗)。
2. 不正常懷孕的第20週之前，不可投藥，因為很多胎兒會不正常。
3. 高血壓，糖尿病及心臟損傷的病人，要小心使用。
4. 若溶液變色或混濁或含沈澱物，則不能投與。
5. 口服治療期間若分娩再發，則準備開始靜脈滴注。
6. 注意推薦的稀釋液是150mg ritodrine (3安瓿) 於500ml的sodium chloride, 5% dextrose, 10% dextran 40於sodium chloride, 或10%轉化糖中，產生的最後濃度是每ml含0.3mg ritodrine之滴注溶液。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級：在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

(尤其是靜脈滴注) 改變母體與胎兒的心跳速度及血壓，暫時提昇血糖

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DI0030101

學名：Ritodrine

商品名：aNPo 10MG (安胎)

中文名：安寶錠



及胰島素，低血鉀，心悸，噁心，震顫，頭痛，紅斑。

六、此藥儲存時的條件為何？

一般藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師