

用藥指導單張

衛教小組 DQ1890101

學名：Sunitinib

商品名：SUTENT ★ 12.5MG (依診斷事審)

中文名：紓癌特膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

SUTENT適用於imatinib mesylate治療期間出現疾病惡化或對該藥出現不能忍受之腸胃道間質腫瘤；治療晚期或轉移性腎細胞癌(病理上為亮細胞癌(clear cell carcinoma))。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

每天4粒，一次頓服4粒，服用1療程後需停藥觀察2周後繼續服用。一個療程6周。

三、使用時我該注意的特別事項？

sunitinib的妊娠期用藥安全性為D類。對於孕婦和準備懷孕者，需要告知sunitinib對胚胎發育可能存在潛在危害。服藥期間哺乳婦女宜暫停哺乳。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見不良反應包括疲勞、腹瀉、食欲減退、噁心、胃炎、嘔吐、腹痛。必要時可適當給予止瀉藥或止吐藥。約1/3的病人會出現皮膚變色。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師