

用藥指導單張

衛教小組 DQ0740201

學名：Enzalutamide

商品名：Xtandi ★ F.C.TAB 40MG (健保事審)

中文名：安可坦膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療：

- (1) 轉移性的去勢敏感性前列腺癌 (mCSPC)，且與雄性素去除療法併用。
- (2) 風險非轉移性的去勢抗性前列腺癌。
- (3) 轉移性的去勢抗性前列腺癌，且在雄性素去除療法失敗後屬無症狀或輕度症狀而不須使用化學治療者。
- (4) 轉移性的去勢抗性前列腺癌，且已接受過docetaxel治療者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

建議劑量為口服enzalutamide 160 mg (4粒40 mg膜衣錠或2粒80 mg膜衣錠) 每天一次。

對非手術去勢的病人，應持續以LHRH類似物做藥物去勢治療。如果錯過平常服用Xtandi的時間，應盡快補服處方劑量。如果錯過了一整天的劑量，應於第二天以一般每日劑量恢復治療。

如果出現 ≥ 3 級毒性或無法耐受之副作用，應暫停給藥一週或直至症狀改善至 ≤ 2 級後，再恢復原劑量治療，如有必要，可減低劑量(120 mg或80 mg)治療。

給藥 法

Xtandi 服使。膜衣錠不應切割、壓碎或咀嚼，應以整粒吞服，可隨餐或空腹服。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

X 級：不論是動物或人體的研究試驗中均顯示該藥物對胚胎有不良影響，且此藥物對懷孕婦女所產生的效益很低，則此藥對妊娠婦女或可能懷孕的婦女為禁忌使用。

五、此藥會造成什麼副作用？

最常見的不良反應為無力/疲勞、熱潮紅、頭痛和高血壓。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DQ0740201

學名：Enzalutamide

商品名：Xtandi ★ F.C. TAB 40MG (健保事審)

中文名：安可坦膜衣錠



六、此藥儲存時的條件為何？

25°C 以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師