用藥指導單張

衛教小組 DE10370101

學　名：Empagliflozin

商品名：JARDIANCE 25MG(高劑量)

中文名：恩排糖膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1.血糖控制：第二型糖尿病。

2.預防心血管事件：用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，JARDIANCE可降低心血管原因死亡的風險。

【使用上的限制】：JARDIANCE不建議用於第一型糖尿病病人或用於治療糖尿病酮酸中毒。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
建議劑量為每日早上一次、每次 10mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。當耐受性良好，劑量可提升至 25mg。

腎功能狀態病　的 JARDIANCE 建議劑量:

eGFR ≧ 30 mL/min/1.73m2 : 無需調整劑量

eGFR < 30 mL/min/1.73m2, End-Stage Renal Disease (ESRD)或透析:禁　JARDIANCE。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.JARDIANCE 可引發血管內容量減少。開始使用 JARDIANCE 之後可能發生帶有症狀的低血壓，尤其在腎功能不全病人、老年人、收縮壓較低的病人，以及正使用利尿劑的病人身上。開始使用 JARDIANCE 前，請先評估是否有血管內容量減少的狀況，並於適當時矯治液體容量狀態。應監測開始接受治療後是否出現低血壓的徵象和症狀，並於預期會出現血管內容量減少的臨床情境下提高監 測次數。

2. 在開始使用 JARDIANCE 治療之前應先評估病人的腎功能，並在之後定期進行監測。

3. 胰島素與胰島素促泌劑已知都可能引發低血糖。JARDIANCE 與胰島素促泌劑（例如，磺醯尿素類藥物）或胰島素併用時，低血糖的發生風險較高。因此，與 JARDIANCE 併用時，可能須調降胰島素促泌劑或胰島素的劑量，以減少發生低血糖的風險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

衛教小組 DE10370101

學　名：Empagliflozin

商品名：JARDIANCE 25MG(高劑量)

中文名：恩排糖膜衣錠



致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

低血壓、急性腎臟損傷及腎功能不全。

六、此藥儲存時的條件為何？

請儲存於 30° C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09