

用藥指導單張

衛教小組 DM10600101

學名：Calcium folinate

商品名：folina（口服）15mg

中文名：芙琳亞錠



一、此藥品的用途是什麼？

超量使用葉酸拮抗劑時，消滅其毒性及抵消其作用、治療因斯發盧營養缺乏、妊娠及其幼齡等引起之巨初紅血球性貧血。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 高劑量methotrexate使用後的救助法

通常於methotrexate開始輸注給藥後8~24小時內施予Folina救助療法，每次口服15mg（相當於10mg/m²）；每6小時一次，連續給予10個劑量。每天至少需檢測一次血清肌酸酐(creatinine)和methotrexate的血中濃度。除施予Folina救助療法外，並給予大量飲水或靜脈輸液及鹼化尿液使尿液之pH大於或等於7.0，直至methotrexate的濃度小於5x10⁻⁸M（0.05 micromolar）為止。

2. 治療葉酸缺乏症小於12歲之孩童：

每天每公斤給予0.25mg（0.25mg/kg/day）成人每天：10~20mg，以每日口服一錠Folina（1 tablet/day）最常使用。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 依處方於特定情形下，極度小心地使用本藥，倘遇任何不適狀況，甚或是先前產生的狀況，都請與醫師諮商。
2. 對缺乏葉酸或如適應症述及情形下的孕婦及授乳婦，並未禁用本藥。然禁用methotrexate之孕婦及授乳婦，於治療時則無須此類之預防性治療。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

不良反應很少見，但曾有過敏反應[包括：類過敏性反應、蕁麻疹]。

六、此藥儲存時的條件為何？

25℃以下儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師