用藥指導單張

衛教小組 DR14430101

學　名：Dantrolene

商品名：DANTERLENE 25MG(自費)

中文名：特寧膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

1. 慢性痙攣：如脊髓損傷、中風、腦性麻痺或多發性硬化症引起之復發性痙攣。

2. 惡性高熱：術前預防惡性高熱，以及惡性高熱重症後預防復發。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

慢性痙攣：

常　劑量重要的是要個別化調整劑量以獲得最　效果。建議使　能產　最佳反應的最低劑量。鑑於長期使　Dantrolene sodium capsule 可能造成肝損傷，如果在 45 天內效益不明顯，則應停　治療。

成

建議依以下步驟調整劑量，有些病　在達到更　的每　劑量前不會有反應。

每個劑量應維持 7 天以確定病　的反應，如果在下　個劑量沒有觀察到進　步效益，劑量應該減少到前　個劑量。

每次 25mg，每天 1 次，連續 7 天，然後，

每次 25mg，每天 3 次，連續 7 天，

每次 50mg，每天 3 次，連續 7 天，每次 100mg，

每天 3 次。某些病　可能需要每天 4 次的劑量治療。

每　總劑量不應超過每天 4 次、每次 100 毫克。

惡性　熱：

術前預防：

術前 1　2天，將4　8 mg / kg /day 的Dantrolene sodium capsule 劑量分成 3 或 4 次　服使　。最後　次給藥應在預定　術前約 3-4 個　時給予，並以最　量的　服　。此劑量通常會產　骨骼肌無　和鎮靜(嗜睡和疲倦)，通常可在建議劑量範圍內調整，以避免失能或過度胃腸道過度刺激，包括噁　及/或嘔吐。

惡性　熱危象後治療：

惡性　熱危象後也應　服 Dantrolene sodium capsule，劑量為每天 4　8 mg/kg，分成 4 次服　，持續 1　3 天，以防　惡性　熱復發。

特殊族群　法　量

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10

用藥指導單張

衛教小組 DR14430101

學　名：Dantrolene

商品名：DANTERLENE 25MG(自費)

中文名：特寧膠囊



慢性痙攣　兒病　：建議依以下步驟調整劑量，有些病　在達到更　的每　劑量前不會有反應。每個劑量應維持 7 天以確定病　的反應，如果在下　個劑量沒有觀察到進　步效益，劑量應該減少到前　個劑量。 0.5 mg/kg，每天 1 次，連續 7 天，然後，

0.5 mg/kg，每天 3 次，連續 7 天，

1 mg/kg，每天 3 次，連續 7 天，

2 mg/kg，每天 3 次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 肺功能損傷，尤其是慢性阻塞性肺病，以及因　肌疾病導致　臟功能受損的病　，應謹慎使　。
2. Dantrolene 與伴有嗜酸性粒細胞增多的胸腔積液有關。
3. 有既往肝病或肝功能異常病　應謹慎使　。
4. 併　鎮靜劑時應謹慎。
5. 服　本品可能引起光過敏反應。 服　時應警告病　不要暴露在陽光下。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

嗜睡、頭暈、虛弱、全　不適、疲勞和腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

密閉貯存於25℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.10