用藥指導單張

衛教小組 DL12370101

學　名：Sulpiride

商品名：SUNPYLON 50MG

中文名：舒必朗錠



一、此藥品的用途是什麼？

精神病狀態、消化性潰瘍。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

精神分裂病：

通常成人1日300~600mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。每日最高劑量為1200mg。

憂鬱病、憂鬱狀態：

通常成人1日150~300mg，分次口服。但可以依年齡、症狀做適宜的增減。每日最高劑量為600mg。

胃、十二指腸潰瘍：

通常成人1日150mg，分三次口服，並依病情酌量增減。

三、使用時我該注意的特別事項？

一、胃、十二指腸潰瘍時：

1.一般注意事項：給與本劑可能會出現間腦之內分泌機能調節異常，錐體外徑症狀等的副作用，所以，給與本劑時，須充分考慮其有效性與安全後使用。

2.下列患者請勿給藥：疑似有嗜鉻細胞瘤之患者(有引起血壓急劇上升之虞)。

3.下列患者應慎重給藥：

(1)小兒(易出現錐體外徑症狀，故須注意給藥，不可過量)。

(2)老年人。

4.對孕婦的給藥：有關懷孕中給藥的安全尚未確立，所以，在孕婦或可能已懷孕的婦女，限於判斷其治療 上的有益性超越危險性時，才可給藥。

5.對授乳婦的給藥：對新生兒之安全性尚未確立，所以，在授乳期間的婦女，限於判斷其治療上的有益性 超越危險性時，才可給藥。

6.其他：

(1)對於正在給與本劑之患者，須注意勿使其從事開車等伴有危險性的機械操作。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.23

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital

用藥指導單張

衛教小組 DL12370101

學　名：Sulpiride

商品名：SUNPYLON 50MG

中文名：舒必朗錠



(2)因有止吐作用，所以可能會使腸阻塞，腦瘤等引起的嘔吐症狀變得不明顯，故須嚴密觀察，慎重給藥。

二、精神分裂病時：

1.下列患者請勿給藥：疑似有嗜鉻細胞瘤之患者(有引起血壓急劇上升之虞)。

2.下列患者應慎重給藥：

(1)有或疑似有心、血管疾病、低血壓之患者。

(2)有腎病變之患者。

(3)高齡者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

消化系：偶有口渴、胃灼熱、噁心、嘔吐、便秘等。

其他：罕有發疹、浮腫，但有這種情形時，仍須中止給藥。

另外、偶有熱感、倦怠感、失眠、嗜睡、眩暈、搖晃，另外，罕有性慾減退。

肝臟：偶GOT.GPT.Al-P等之上昇。

皮膚：偶有發疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

遮光密封室溫貯存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.23