

用藥指導單張

衛教小組 DB12990101

學名：Hydrocortisone

商品名：solu-CORTEF 100MG

中文名：舒汝固體膚滅菌注射粉劑



一、此藥品的用途是什麼？

腎上腺皮質機能不全、劇烈休克、膠原疾病（全身性紅斑性狼瘡）過敏反應（支氣管氣喘）、過敏性皮膚疾患（天皰瘡、剝脫性皮膚炎）。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品可供靜脈注射、靜脈輸注，或肌肉注射，緊急狀況初期最好使用靜脈注射，之後考慮使用較長效的注射劑或口服製劑。開始治療時於30秒（例如相當於100mg hydrocortisone之hydrocortisone sodium succinate）到十分鐘（例如500mg或更多量時）以靜脈投予治療。

起始劑量為100mg到500mg或更大量（hydrocortisone相當於hydrocortisone sodium succinate），視病情的嚴重程度而定。可依病人反應及臨床狀況每隔2，4或6小時重複給藥。嬰兒及兒童的劑量可能須減少，但應視病情的嚴重程度和病人反應決定劑量，而非由年齡或體重決定之，每天劑量不應低於25mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

Corticosteroids對於駕駛或操作機械能力的影響尚無全面性的評估，使用corticosteroids後，可能產生暈厥、暈眩及抽搐等不良反應，如產生上述反應，則不應駕駛或操作機械。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

消化不良、情緒變化、暈眩。

六、此藥儲存時的條件為何？

未配製之產品：

存放於控制室溫（20 °C–25 °C）。

配製後之溶液：

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DB12990101

學名：Hydrocortisone

商品名：solu-CORTEF 100MG

中文名：舒汝固體膚滅菌注射粉劑

配製後立即用畢，丟棄未用畢的溶液。



本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師