

用藥指導單張

衛教小組 DA16160101

學名：Atenolol

商品名：ATEOL F.C. 50MG

中文名：壓平樂膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

高血壓、狹心症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

高血壓：

起始量50mg，每日1次，可單獨每日服用1次，或與利尿劑及其他抗高血壓治療劑同時使用，若效果不明顯，則提高到一天可增至100mg，一般限用1-2星期就會有完全之療效。

狹心症：

起始劑量50mg每日1次，若一星期內效果不明顯則提高劑量到一天100mg，有些病人須提高到200mg才能達到適當效果。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 未經治療的心臟衰弱患者，禁服本藥；若經過治療的心臟衰弱患者，可推薦本藥物，但服用後若有鬱血性心臟衰竭的情況發生時，則應暫停使用。
2. 本藥物藥理作用之一是降低心跳率，可能出現心跳緩慢現象，若發生此時可減少藥量。
3. 本藥物具有選擇性的作用在心臟乙型接受體上，所以患有慢性呼吸道阻礙的病人需小心使用。因它也可能引起氣喘病人的呼吸道阻礙。
4. 患有心缺血病人，治療不可突然中斷，如果本藥物與Clonidine同時服用時，Clonidine不宜中斷服用，須直至本藥物停止服用數天才可停止。
5. 用於麻醉手術前，宜停用本藥物且間隔須在十八小時以上，如治療需繼續使用，麻醉劑如乙醚、Cyclopropane及Trichloroethylene宜特別注意。若發生Vagal dominance，可用1-2 mg (I.V.) Atropine解除。
6. 本藥物是經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應依情況調整劑量。一般而言病人其Creatinine Clearance若為15-35 ml/min/1.73m²，則服用劑量應為每日50 mg；若小於15 ml/min/1.73m²，則服用劑量應為隔一天服用50 mg。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DA16160101

學名：Atenolol

商品名：ATEOL F.C. 50MG

中文名：壓平樂膜衣錠



此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

四肢冰冷，肌肉疲勞，心跳緩慢。

六、此藥儲存時的條件為何？

25° C 以下避光儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師