

用藥指導單張

衛教小組 DL15280101

學名：Risperidone

商品名：RISPERIDONE F.C 2MG

中文名：瑞波膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

思覺失調症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性、躁動或精神病症狀、行為障礙和其他破壞性行為障礙、兒童及青少年自閉症之躁動症狀。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

思覺失調症

成人

可每日服用RISPERIDONE 一次或二次。病人須從RISPERIDONE 2mg/day 開始給藥。劑量可在第二天增至4 mg。

兒童（13-17歲）

建議起始劑量為每天一次，每次0.5 mg，可在早上或下午使用。必要時，劑量可依個人耐受度以每天0.5 mg或每天1 mg的增加量增加至建議劑量每天3 mg（每次調整劑量的間隔不可小於24小時）。

老年人（65歲及65歲以上）

建議起始劑量為每天兩次每次0.5 mg。劑量可視個別情況以每天兩次每次0.5 mg的增加量增至每天兩次每次1-2 mg。

雙極性疾患之躁症發作

成人

Risperidone 須每日給藥一次，起始劑量為2 mg或3 mg。必要時，劑量調整的間隔不得低於24小時，且劑量增加速度最高為每天1 mg。每日1-6 mg的彈性劑量曾觀察到療效。

兒童（10-17歲）

建議起始劑量為每天一次，每次0.5 mg，可在早上或下午使用。必要時，劑量可依個人耐受度以每天0.5 mg或每天1 mg的增加量增加至建議劑量每天2.5 mg（每次調整劑量的間隔不可小於24小時）。

阿茲海默型失智症病人之躁動、攻擊行為或精神病症狀

建議起始劑量為每天兩次，每次0.25 mg。必要時，劑量可依個別情況以每天兩次每次0.25 mg的增加量增加，最快可每兩天調整一次。大部分病人的最佳劑量為每天兩次，每次0.5 mg。然而，某些病人需達每天兩次，每次1 mg的劑量。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL15280101

學名：Risperidone

商品名：RISPERIDONE F.C 2MG

中文名：瑞波膜衣錠



行為障礙和其他破壞性行為障礙（5-18 歲）

對於病人體重 ≥ 50 kg，其建議起始劑量為每天0.5 mg。必要時，劑量可依個別情況以每天0.5mg的增加量增加，最快可每兩天調整一次。大部分的病人的最佳劑量為每天一次，每次1 mg。有些病人可能只需要每天0.5 mg的劑量即可改善，而有些則需每天1.5 mg的劑量。對於病人體重 < 50 kg，其建議起始劑量為每天0.25 mg。

兒童及青少年自閉症之躁動症狀

兒童（5-17歲）

RISPERIDONE 的劑量應該依個人的需求和反應做調整。

對於體重 < 20 kg的病人，起始劑量為每天0.25 mg；對於體重 ≥ 20 kg的病人，起始劑量為每天0.5 mg。

在第四天時，對於體重 < 20 kg的病人劑量可增加0.25 mg；對於體重 ≥ 20 kg的病人，劑量可增加0.5 mg。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

失眠、躁動不安、焦慮、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於25° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師