用藥指導單張

衛教小組

學　名：Isoflurane

商品名：AERRANE★ 1HR.

中文名：愛爾能吸入劑



一、此藥品的用途是什麼？

吸入性全身麻醉。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
誘導麻醉量：1.5~3%。維持量：1~3.5%。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.心臟病患應小心使用。2.肌肉鬆弛作用足夠做大部分的手術，若需要追加的鬆弛，使用最小劑量的神經肌肉阻斷劑。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1.肝障礙。2.麻醉中：呼吸抑制，血壓降低，不整脈。3.覺醒時：噁心，嘔吐，惡寒，頭痛。4.惡性高熱。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.14