

用藥指導單張

衛教小組 DC1340201

學名：Lamotrigine

商品名：lamiCTAL 50MG

中文名：樂命達錠



一、此藥品的用途是什麼？

癲癇症及對其他抗癲癇藥無法滿意控制之局部癲癇、泛發性強直性陣攣性癲癇之輔助療法及LENNOX-GASTAUT徵候群。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人及12歲以上小孩對於那些沒有服用Sodium valproate者，初劑量授予50mg，一天一次，持續二星期。接著每天授予100mg，分兩次授予，持續二星期。其後，平時之維持劑量每天200~400mg分兩次授予，可達到最好的效果。對於正在服用Sodium valproate的病人，初劑量隔天授予25mg，持續二星期。接著每天授予25mg，持續二星期。此後平時之維持劑量100~200mg/天，一天授予一次或分兩次授予，可達最佳效果。
2. 對於正在服用Sodium valproate的病人，初劑量隔天授予25mg，持續二星期。接著每天授予25mg，持續二星期。此後平時之維持劑量100~200mg/天，一天授予一次或分兩次授予，可達最佳效果。
3. 本品有苦味，請整粒吞服，不可嚼碎。
4. 12歲及以下之小孩：尚無充分的資料可取。
5. 老年人：少數資料關於老年病人使用Lamictal，迄今無跡象顯示用於這年齡層的反應不同於年輕者，不過應該小心治療，嚴密觀測。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 可得的資料暗示在Lamotrigine劑開始治療時，超過建議劑量將增加發疹的機率，而需停止治療。Lamictal是一種二氫葉酸還原酶之微弱抑制劑，因此長期治療期間有干擾葉酸鹽代謝的可能性。不過在長達一年的人體用藥，Lamotrigine並沒有對於血紅素濃度、平均血球體積、血清或紅血球細胞葉酸鹽的濃度引起有意義的變化。
2. 和其它抗癲癇藥一樣，突然中斷Lamictal，可能致使反彈性癲癇發作。此種危險可輕由兩週的劑量逐漸的減少而避免。
3. 肝臟代謝後隨著腎臟分泌排除是Lamotrigine的主要排除途徑。目前為止，使用Lamictal之病人尚無被勸告會出現有意義的肝或腎功能的傷害。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DC1340201

學名：Lamotrigine

商品名：lamiCTAL 50MG

中文名：樂命達錠



4. 小孩及肝、腎功能不全之病人避免使用。
5. 服用本品的患者不宜開車或從事具危險性的工作。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

在臨床上作雙盲添加試驗，服用Lamotrigine的病人有10%產生皮膚疹，而服用安慰劑的病人有5%產生，2%人因皮膚疹而停止Lamotrigine的治療、通常出現斑丘疹，一般出現在開始治療的四週內，且停止Lamotrigine後即可恢復、罕見的幾種皮膚疹包括血管水腫及Stevens-Johnson症狀曾被報導、在使用Lamictal加上其它標準抗癲癇藥物之治療的試驗中曾有其它副作用的報告，包括複視、視力模糊、昏眩、嗜睡、頭痛、不安、疲勞、胃腸煩悶及易怒/具攻擊性。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師