

用藥指導單張

衛教小組 DC2020101

學名：Oxcarbazepine

商品名：TRILEPTAL 300MG

中文名：除癲達膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

成人局部癲癇發作之單一或輔助治療，大於三歲孩童癲癇局部發作之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 每日劑量超過2400毫克的用法尚未在臨床試驗中測試過，目前只有非常有限的經驗使用過高達每日4200毫克的劑量。
2. 成人及老年病患：a. 單獨治療：Trileptal開使用量每天600mg (8~10mg/Kg/day) 分兩次給藥，每天劑量600mg至2400mg間可提供理想的療效。若臨床上需要，劑量可以採每週最多增加600mg的方式。以獲得較佳的臨床反應。b. 輔助治療：Trileptal開使用量須每天600mg (8~10mg/Kg/day) 分兩次給藥，每天劑量600mg至2400mg間可提供理想的療效。若臨床顯示，劑量可以採每週最多增加600mg的方式。以獲得較佳的臨床反應。
3. 兒童：兒童應以每日8~10毫克/公斤體重的Trileptal開始治療，分兩次投與。於輔助治療，以大約每日30毫克/公斤體重的維持劑量，即能獲得良好的治療效果。如果臨床上需要，可以採每週最多比起始劑量增加10毫克/公斤/天的劑量，至最大的劑量46毫克/公斤/天，以獲得期望的臨床反應。Trileptal尚未有使用於2歲以下兒童的臨床經驗。
4. 肝功能損害病患：輕至中度肝功能損害的病患並不須調整劑量。Trileptal尚未於嚴重肝功能損害病患進行臨床試驗。
5. 腎功能損害病患：腎功能不良患者(肌酐清除率低於30ml/min)，以Trileptal治療的初劑量應為一般起始劑量的一半(每天300mg)，再逐漸增加劑量以達到理想的臨床效果。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對carbamazepine類藥品過敏的患者，有大約25~30%的患者，亦可能對Trileptal產生過敏反應，此點應告知病人。
2. 所有患有心臟功能不足及續發性心臟衰竭的患者，均應定期地測量體重，以確定是否有液體蓄積的問題。如果發生液體蓄積或心臟狀況惡化的情形時，應檢測其血清血清鈉值。萬一發現有低血鈉症的情形，限制水份的攝取對恢復其鈉值是非常重要的方法。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DC2020101

學名：Oxcarbazepine

商品名：TRILEPTAL 300MG

中文名：除癲達膜衣錠



3. 雖然臨床試驗無法證實oxcarbazepine與心臟傳導的損害有關，如果患者以前就有傳導障礙的問題存在時(例如：心房心室傳導阻礙、心律不整)，均應小心地追蹤。

4. Trileptal導致肝炎的粒子非常罕見，通常此問題都可以順利地解決；如果懷疑有肝炎的現象，應考慮停止Trileptal的治療。

5. Trileptal與酒精一起併用時亦應十分小心，因為可能會引起加成的鎮靜作用。

6. 如同其他抗癲癇的藥物一般，Trileptal應該要逐漸地停藥，以降低發作次數增加的危險性

7. 曾有報告顯示Trileptal會導致眩暈及嗜睡的副作用，患者應被告知使用Trileptal可能會損害開車或操作機械所應有的生理和/或心理能力。

8. 劑量超過的症狀包括嗜睡、眩暈、噁心、嘔吐、運動減退、低鈉血症、運動失調及眼球震顫。目前沒有特別的解藥，只能採取適當的症狀及支持性療法，亦可以考慮採用洗胃及/或給予活性炭來排出此藥品或減弱此藥品的作用。

9. 本品可能發生嚴重的皮膚不良反應，大人及小孩都曾有案例報告，包括Stevens-Johnson syndrome (SJS)及毒性皮膚壞死(TEN)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 中樞神經：非常常見：眩暈、頭痛、嗜睡；常見：精神激昂、健忘、神情呆滯、運動失調、注意力減弱、紊亂、沮喪、情緒不穩定（例如：緊張）、眼球震顫、震顫。

2. 中樞血管系統：非常罕見：心律不整(例如：心房心室傳導受阻)。

3. 消化系統：非常常見：噁心、嘔吐；常見：便秘、腹瀉、腹痛。

4. 血液方面：不常見：白血球減少；非常罕見：血小板減少。

5. 肝臟：不常見：氨基轉移酵素及/或鹼性磷酸鹽酵素增加；非常罕

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC2020101

學名：Oxcarbazepine

商品名：TRILEPTAL 300MG

中文名：除癲達膜衣錠



見：肝炎。

6. 代謝及營養異常：常見：低鈉血症；非常罕見：因低鈉血症而伴有之徵兆及症狀，例如抽搐、紊亂、意識減弱、腦病(請見‘中樞神經系統’的副作用)、視力異常(例如：視力模糊)、嘔吐、噁心。

7. 特殊感官：非常常見：複視；常見：眩暈、視力異常(例如：視力模糊)。

8. 皮膚及其附屬器官：常見：粉刺、禿頭、皮疹；不常見：蕁麻疹；非常罕見：Steven-Johnson症候群、全身性紅斑性狼瘡。

9. 全身：非常常見：疲勞；常見：無力衰弱、非常罕見：血管水腫、多重器官過敏症異常(特徵微皮疹、發燒、淋巴腺病、肝功能檢驗異常、嗜伊紅血球減少、關節痛)。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師