

用藥指導單張

衛教小組 DN9060401

學名：Snake venom antiserum

商品名：抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清凍晶注射劑

中文名：



一、此藥品的用途是什麼？

對雨傘節及飯匙倩毒蛇咬傷有特異性之治療效果。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

稀釋方法：

取稀釋液10毫升(mL)溶解一劑量(含1,000 田中單位以上)，本品應完全溶解後於二小時內用完。

注射時間：

抗蛇毒血清不能中和已與組織細胞結合之毒素，故毒蛇咬傷後注射本血清愈早，收效愈佳。

注射部位：

咬傷時間不超過二小時，且無全身症狀者，可將一半血清注射於咬傷部周圍皮下，一半作肌肉注射。咬傷時間超過二小時，或已出現全身症狀者，應將小部份血清注射於咬傷部周圍皮下，大部份作靜脈注射。靜脈注射時，第1毫升須經數分鐘時間注完，以後注射速度，每分鐘不得超過1毫升，同時密切注意患者反應，以防萬一。

注射劑量：

成人用量普通為一劑量，十歲以下小兒用量加倍。如注射後局部或全身症狀仍繼續增惡，則應每隔半小時至二小時再注射一劑量至全身症狀改善。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品應完全溶解後於2小時內用完。
2. 被咬傷後4小時注射抗蛇毒血清最有效，超過8小時者效果較差，大量注射時應特別留意血清病的發生。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

1. 血清休克：對血清過敏之人，縱以微量血清，從任何徑路注射，有時於數分鐘至一小時發生嚴重之血清休克，症狀如蕁麻疹、腹痛、腰痛，嚴

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DN9060401

學名: Snake venom antiserum

商品名: 抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清凍晶注射劑

中文名:



重時呼吸困難,發紺、血壓下降、虛脫致死。

2. 惡寒發熱:此反應萬一發生,多見於靜脈注射後 20分至一小時,可行對症療法。

3. 血清病:患者起蕁麻疹、發熱、淋巴腺腫脹、關節痛等症狀,以注射後4~10日最常見,亦有延至一個月而發生者,此時腎上腺素可收效,但作用短暫。

4. Arthus反應:注射後7日至3個月,再注射同種動物血清時,局部可起反應,進行至組織壞死,本反應須與膿瘍鑑別。

六、此藥儲存時的條件為何?

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍);如發生變質或過期,不可再使用。

本單張資料僅供參考·如有疑問請諮詢藥師