

用藥指導單張

衛教小組 DI16550101

學名：Corifollitropin alfa

商品名：(生醫) ELONVA INJ 150MCG/0.5ML(自費)

中文名：伊諾娃注射液



一、此藥品的用途是什麼？

在婦女接受人工協助生殖技術計劃時，本品與性腺刺激素釋放激素拮抗劑 (GnRH antagonist) 併用，使用於控制下刺激卵巢，以誘導多個濾泡發育。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

年齡在36歲(含)以下且體重60公斤以下($\leq 60\text{kg}$)女性建議使用劑量為單劑100微克。

建議單劑150微克劑量使用於下列女性：不限年齡且體重為60公斤以上。

年齡大於36歲且體重為50公斤(含)以上。

尚未針對年齡大於36歲且體重為50公斤以下的女性進行研究。

年齡 \ 體重

50公斤以下

50 - 60公斤

60公斤以上

36歲(含)以下

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DI16550101

學名：Corifollitropin alfa

商品名：(生醫) ELONVA INJ 150MCG/0.5ML(自費)

中文名：伊諾娃注射液



100微克

100微克

150微克

36歲以上

未研究

150微克

150微克上述建議劑量，目前只有在刺激療程第五或六日之後合併使用 GnRH拮抗劑 (GnRH antagonist) 之療程被確立。

刺激療程第一日：Elonva 應於月經週期之早期濾泡期，以單次皮下注射方式投與，最好是皮下注射於腹壁。

刺激療程第五或六日：

使用性腺刺激素釋放激素拮抗劑 (GnRH antagonist) 治療，應在刺激療程第五或第六日開始依卵巢反應而定，包括濾泡生長的數目、大小。同步檢測血清雌激素濃度也可能編有幫助。GnRH 拮抗劑可避免促黃體生成荷爾蒙 (LH) 早發性的激增。

刺激療程第八日：

在刺激療程第一日注射 Elonva 七天之後，受控制下卵巢刺激 (Controlled Ovarian Stimulation, COS) 療法可能需要繼續施以每日注射 (基因重組) 濾泡刺激素 ((rec)FSH) 直至達到誘發卵細胞成熟的標準 (三個濾泡 $\geq 17\text{mm}$)。在刺激療程第五或六日以後需藉超音波檢測定期監控卵巢反應，每天 (rec) FSH 使用劑量需視卵巢反應而定；反應正常者每日建議使用量為150國際單位 (IU) 之 (rec) FSH。在投予人類絨毛膜性腺刺激素 (hCG) 當天，可不必投予 (rec) FSH。一般而言，平均在治療的第九天 (6至18天) 便會達到足夠的濾泡發育。

當觀察到3個濾泡 $\geq 17\text{毫米}$ 時，即可於當天或第二天注射一劑5,000至10,000 IU的 hCG，藉以誘發最終卵細胞成熟。如果出現卵巢過度反應的現象，請參見第4.4節中

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DI16550101

學名：Corifollitropin alfa

商品名：(生醫) ELONVA INJ 150MCG/0.5ML(自費)

中文名：伊諾娃注射液



的建議，藉以降低發生卵巢過度刺激症候群（ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS）的風險。

三、使用時我該注意的特別事項？

在開始治療之前，應先針對夫妻的不孕情形進行適當的診斷。尤其應針對婦女評估是否有甲狀腺機能低下、腎上腺皮質功能不足、高泌乳激素血症、以及腦下垂體或下視丘腫瘤的問題，並施以適當的治療。在開始 Elonva 治療前，應評估禁止懷孕的醫療狀況。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

骨盆不適感、OHSS、頭痛、骨盆疼痛、噁心、疲勞和乳房壓痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. 請貯存於冰箱中(2° C-8° C)。為方便使用起見，病人可將本品存放25° C或(含)以下的溫度，但不可超過1個月。
2. 切勿冷凍。
3. 請將針筒保存於包裝盒中，以避免光線照射。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師