

用藥指導單張

衛教小組 DL4160101

學名：Mirtazapine

商品名：SMILON F.C. 15MG

中文名：舒美寧膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

鬱症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本藥錠為口服使用，可配水整錠吞服不須咀嚼。

成人：開始治療之起始劑量為每日15mg，可依臨床反應增加劑量以達到理想療效。常用的藥效日劑量為15~45 毫克。

老年人：推薦劑量與成人相同。老年人當須增加劑量時，應在嚴密監測下進行，以確保理想而安全的臨床反應。

孩童與18 歲以下青少年：用Mirtazapine 來治療患有鬱症的孩童與18 歲以下青少年之安全性與有效性尚未建立。此族群的安全與有效性不可能由成人研究資料外推而來，因此並不建議使用Mirtazapine 來治療。

腎臟或肝臟功能不全的病人，對Mirtazapine 的廓清率可能較低，因此這類患者給予Mirtazapine 時須留意。Mirtazapine 之半衰期為20~40 小時，因此Mirtazapine 適合於每日使用一次。建議在每晚睡前服藥一次。Mirtazapine 也可將每日劑量平均分開來服用(如：早上服藥一次，晚上服藥一次)。

本治療最好能持續 4~6 個月直到病人完全無臨床症狀，然後才逐漸停藥。病人在接受適當劑量治療2~4 週內症狀即會有所改善，若治療反應不明顯，則可增加劑量至最大劑量。如果再經過 2~4 週的治療，仍無改善，則應停止治療。

三、使用時我該注意的特別事項？

醫師須留意下列症狀，例如：發燒、喉嚨痛、口腔炎或其他感染徵兆。當有上述症狀發生時，應停止治療並做血球數目檢查。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL4160101

學名：Mirtazapine

商品名：SMILON F.C. 15MG

中文名：舒美寧膜衣錠



四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見副作用：食慾增加與體重增加。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於室溫25℃，避光防潮儲存。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師