用藥指導單張

衛教小組 DL15080101

學　名：Paliperidone

商品名：INVEGA TRINZA INJ 525MG

中文名：善妥達持續性藥效肌肉注射懸浮劑



一、此藥品的用途是什麼？

INVEGA TRINZA是一種3個月型注射劑，用於已使用INVEGA SUSTENNA (1個月型paliperidone palmitate持續性藥效注射用懸浮液)充分治療至少4個月後之思覺失調症病人。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

本品應每3個月注射一次。

注射用藥給藥之前，均應先肉眼觀察是否有異物及變色的現象。

一定要用力振搖至少15秒，以確保形成均勻的懸浮液。應於用力振搖後的5分鐘內注射本品。

本品僅供肌肉注射使用。

切勿透過任何其他途徑給藥。應小心避免不慎注入血管。

應一次注射全部劑量；切勿將一劑分成數次施打。應緩慢注入手臂三角肌或臀部肌肉深部。

思覺失調症成人開始投予INVEGA TRINZA後即應每3個月注射一次。投藥時間範圍應避免錯過投予INVEGA TRINZA的時間。

如果有需要，可於3個月時間點的前後2週內為病人進行注射。

三、使用時我該注意的特別事項？

囑咐病人在用INVEGA TRINZA治療期間避免飲酒。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

心跳加快，嗜睡、低血壓、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

請貯存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.23