用藥指導單張

衛教小組 DA0710101

學　名：Sacubitril+Valsartan

商品名：entRESTO（健安心）F.C.100MG

中文名：健安心膜衣錠

一、此藥品的用途是什麼？

核准用於治療慢性心臟衰竭（ 紐約心臟學會 [NYHA] 第二級至第四級）且心室射出分率降低的患者，減少心血管死亡和心臟衰竭住院風險。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 禁止與ACEI併用。如欲從原本使用的 ACEI 轉換為本品，兩種藥物之間須間隔36小時的藥物排除期。
2. 建議起始劑量為每日兩次100毫克。依據患者耐受情況於2至4週後加倍本品劑量，達到每日兩次200毫克的目標維持劑量。
3. 目前未服用 ACEI 或ARB 的患者，或是之前使用低劑量前述藥物的患者，建議之起始劑量為每日兩次 50毫克。依據患者耐受情況，每2至4週加倍本品劑量，達到每日兩次200毫克的目標維持劑量。
4. 重度腎功能不全(eGFR<30mL/min/1.73m2) 患者之建議起始劑量，為每日兩次50毫克。依據患者耐受情況，每2至4週加倍本品劑量，達到每日兩次200毫克的目標維持劑量。
5. 輕度或中度腎功能不全患者，不需要調整起始劑量。
6. 中度肝功能不全(Child-Pugh B 級) 患者之建議起始劑量，為每日兩次50毫克。依據患者耐受情況，每2至4週加倍 本品劑量，達到每日兩次200毫克的目標維持劑量。
7. 輕度肝功能不全患者，不需要調整起始劑量。
8. 不建議重度肝功能不全患者使用此藥物。

三、使用時我該注意的特別事項？

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

低血壓、高血鉀。

六、此藥儲存時的條件為何？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03

用藥指導單張

衛教小組 DA0710101

學　名：Sacubitril+Valsartan

商品名：entRESTO（健安心）F.C.100MG

中文名：健安心膜衣錠

請儲存於 30° C 以下，注意防潮，並儲存於原始包裝中。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.03