

用藥指導單張

衛教小組 DC1950101

學名：Topiramate

商品名：topamax 25mg(低劑量)

中文名：妥泰膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

用於成人及二歲以上兒童局部癲癇或併有LENNOX-GASTAUT症候群之癲癇及原發性全身性強直陣攣癲癇的輔助治療；預防偏頭痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

最小有效劑量為每日200mg。常用每日劑量為200～600mg，分兩次服用。某些病人的每日劑量可能需高達上限值1600mg。超過400mg/day的劑量並不會加強病人對本品的反應。每日劑量超過1600mg者未有研究。建議要從低劑量開始治療，逐漸增量至有效劑量。一般建議的Topiramate劑量增加速度如下：

劑量的調整需依照病人的臨床效果而定。有些病人一天給藥一次便有療效。錠劑不可剝碎(因為味苦)，本品不受食物影響。本品的最適劑量不需藉監測血漿濃度。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品會作用在中樞神經系統且可能會造成昏睡、暈眩及其它相關症狀。這些各式輕度或中度的副作用在病人駕駛或操作機械時可能有潛在危險性，特別是在病人尚未完全適應本品時。

2. 本品對小鼠、大鼠及兔子有致畸胎性。本品會穿過大鼠的胎盤屏障。然而，懷孕期間只有在預期利益超過對胎畸兒的可能傷害時，才能使用本品。此外，本品會排泄到授乳大鼠的乳汁內。

3. 抗癲癇藥物(包括本品)需逐漸停藥以降低癲癇發作頻率增加的危險性。於臨床試驗中，逐週遞減100mg/day的劑量。某些病人的停藥雖較快，並未產生併發症。

4. 原型topiramate及其代謝物的主要排除途徑是經由腎臟。腎排除與腎功能有關，與年齡無關。中度或重度腎功能不全病人可能需10～15天才能達到穩定態血中濃度，相較之下，腎功能正常病人僅需4～8天。所有的病人皆須視其臨床效果來調整劑量(即癲癇的控制、副作用的避免)，須提醒的是知有腎功能不全病人每個劑量須較長的時間才能達到穩定狀態。然而，一般而言，本品對中度或重度腎功能不全病人的建議劑量是一般正常病人常用量的一半。

5. 某些病人，特別是易罹患腎結石的病人，可能會增加腎結石形成的危險性，建議給與足量的水份以降低此危險性。腎結石的危險因子

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師


用藥指導單張

衛教小組 DC1950101

學名：Topiramate

商品名：topamax 25mg(低劑量)

中文名：妥泰膜衣錠



包括病人先前已有結石、腎結石及高尿鈣症的家族病史。上述危險因子皆無法可靠的預測病人在本品治療期間是否會產生結石。此外，病人服用其它與腎結石有關的藥物(如Acetazolamide)也會增加危險。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

臨床試驗中使用200~400mg/day的topiramate最常觀察到給藥頻率較高的病人有下列的副作用為：嗜眠、眩暈、運動失調、言語障礙及相關的言語問題、精神運動性遲緩、眼球震顫及感覺異常；此外，較常見的還有疲倦、緊張、不易集中精神或注意力、困惑、抑鬱、厭食、語言問題、焦慮、情緒問題、未特別註明的認知問題、體重減輕及顫抖。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師