

用藥指導單張

衛教小組 DJ12470101

學名：Semaglutide

商品名：RYBELSUS 14MG(高劑量)(自費)

中文名：瑞倍適錠



一、此藥品的用途是什麼？

搭配飲食及運動療法，用於治療血糖控制不良的第二型糖尿病成人病人，以改善血糖控制。

(1) 若病人因耐受不良或有禁忌症而不適合使用 metformin，可做為單一療法。

(2) 與其他糖尿病藥物合併使用。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Semaglutide 起始劑量為每日 3 mg，持續一個月。一個月後，應將劑量增加到每日一次 7 mg 的維持劑量。維持每日一次 7 mg 至少一個月後，如需進一步改善血糖控制，可增加至每日一次 14 mg 的維持劑量。

semaglutide 每日一次的最大建議劑量為 14 mg。服用兩顆 7 mg 的錠劑以達到 14 mg 的效果尚未經過研究，因此不建議此服用方式。

Semaglutide 併用 metformin 及/或鈉-葡萄糖共同轉運蛋白2 抑制劑 (SGLT2i) 或 thiazolidinedione 時，metformin 及/或 SGLT2i 或 thiazolidinedione 可維持目前的劑量。Semaglutide 併用磺醯脲類藥物或胰島素時，可考慮調降磺醯脲類藥物或胰島素的劑量，以減少低血糖風險。

semaglutide 的劑量調整不需要進行血糖自我監測，磺醯脲類藥物和胰島素的劑量調整，則需要血糖自我監測，尤其是一開始使用 semaglutide 並降低胰島素劑量時，建議胰島素應採取逐步減少的方式。

投與投與途徑

瑞倍適為一錠劑形式，每日一次供口服使用。

(1) 本藥品應空腹服用，可在一天中任何時間服藥。

(2) 應搭配少量的水（最多半杯，相當於 120 毫升）整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼，因為尚不清楚是否會影響 semaglutide 的吸收。

(3) 病人服藥後應等待至少30分鐘再進食、喝水或服用其他口服藥物。等待時間少於 30 分鐘會降低 semaglutide 的吸收。

三、使用時我該注意的特別事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DJ12470101

學名：Semaglutide

商品名：RYBELSUS 14MG(高劑量)(自費)

中文名：瑞倍適錠



全身性

Semaglutide 不應使用於第一型糖尿病病人或治療糖尿病酮酸中毒。胰島素依賴型病人在開始接受 GLP-1 受體促效劑治療時，若快速停用胰島素或降低劑量，曾有糖尿病酮酸中毒的報告。臨床上沒有用於紐約心臟學會 (NYHA) 第 IV 級鬱血性心臟衰竭病人的經驗，因此不建議將 semaglutide 用於這類病人。臨床上沒有減重手術病人接受 semaglutide 治療的經驗。

胃腸道作用

使用 GLP-1 受體促效劑可能引起胃腸道不良反應，進而造成脫水，罕見情況下可導致腎功能惡化。應告知接受 semaglutide 治療的病人，胃腸道副作用可能導致脫水的風險，並注意避免體液不足。

急性胰臟炎

使用 GLP-1 受體促效劑的病人曾發生急性胰臟炎，應告知病人急性胰臟炎的典型症狀。疑似發生胰臟炎時，應停用 semaglutide。如果確診，不可重新開始使用 semaglutide。針對具有胰臟炎病史的病人，使用時應特別謹慎。

對駕駛及操作機械能力的影響

semaglutide 不會影響駕駛或操作機械的能力，或影響極輕微。如果與磺醯脲類藥物或胰島素併用，應建議病人在駕駛或操作機械時注意避免低血糖的發生。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、腹瀉及嘔吐。

六、此藥儲存時的條件為何？

存放於原鋁箔片包裝中，避免光線照射或受潮。本藥品請存放於 30°C 以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師