用藥指導單張

衛教小組 DA6900301

學　名：Isosorbide dinitrate

商品名：ANGIDIL 0.1% 10ML

中文名：怡心通注射液



一、此藥品的用途是什麼？

治療狹心症發作。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

靜脈注射：

1.成人及老年人：通常每小時2至12mg已是足夠，但有時需藥劑量高達每小時20mg，因人而異。

2.兒童：通常使用0.1% ANGIDIL之溶劑50ml加在500ml之5%葡萄糖或生理食鹽水溶液之內，使其每ml之濃度為100 ug，注射速度依病人之需要量，詳細請閱讀說明書。

冠狀動脈內注射：在血管內氣球充氣前先給予一次1mg注射，是需要可在30分鐘內再注射5mg以下。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 本品和其他的硝酸鹽和亞硝酸鹽，可能產生耐藥性和交叉耐藥性。
2. 如同所有的硝酸鹽，本品使用在青光眼的患者，須特別小心。
3. 如同Nitroglycerin，本品是一個強力的血管的擴張劑，對於某些病人，使用治療劑量會引起些微的平均血壓下降(約10～15mm/Hg)。
4. 資料支持硝酸鹽使用在急性心肌梗塞的早期(在臨床和實驗室的期間，發現皆不穩定)，仍無法建立其安全性。
5. 過量處理：症狀—類似血管擴張；皮膚朝紅、頭痛、噁心、暈眩和低血壓。治療建議—洗胃、症狀和支持療法應包括氧氣的供給，如果需要，可給予使血管收縮的胺類(如Norepinephrine即適合)。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級： 在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19

用藥指導單張

衛教小組 DA6900301

學　名：Isosorbide dinitrate

商品名：ANGIDIL 0.1% 10ML

中文名：怡心通注射液



可能發生頭痛，噁心及血壓突然降低。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.19