用藥指導單張

衛教小組 DQ14690101

學　名：Pegfilgrastim

商品名：FULPHILA 6MG/0.6ML

中文名：福富血注射劑(預充填注射針筒)



一、此藥品的用途是什麼？

適用於非骨髓性癌症病人在接受易引起臨床上有顯著發生率的嗜中性白血球減少症合併發燒之骨髓抑制性抗癌藥物治療時，以降低嗜中性白血球減少症合併發燒為表現之感染發生率。

Fulphila不可用於造血幹細胞移植時動員周邊血液前趨細胞。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
成人建議劑量為每一化學療法週期單一皮下注射6mg。

請勿在使用細胞毒性化學療法前14天到細胞毒性化學療法後24小時的期間給予Fulphila。使用前，請將裝有Fulphila預充填針筒的小盒由冰箱取出，讓Fulphila預充填針筒放置室溫中(至少30分鐘)。放置於室溫下超過48小時則須丟棄。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 脾臟破裂

給予pegfilgrastim後可能發生包括致命案例的脾臟破裂。給予Fulphila後，若病人有左上腹或肩膀疼痛，應評估是否有脾臟腫大或脾臟破裂。

2. 急性呼吸窘迫症候群(ARDS)

使用pegfilgrastim的病人可能會發生急性呼吸窘迫症候群(ARDS)。給予Fulphila後產生發燒、肺浸潤、或呼吸窘迫，需評估發生急性呼吸窘迫症候群的可能性。發生ARDS時，必須停止使用Fulphila。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

骨痛及四肢痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

1. Fulphila 於盒內避光冷藏貯存在2 到8℃(36 到46℉)。避免振搖。 2. Fulphila 放置於室溫(不超過30℃)超過48 小時後需丟棄。避

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15

用藥指導單張

衛教小組 DQ14690101

學　名：Pegfilgrastim

商品名：FULPHILA 6MG/0.6ML

中文名：福富血注射劑(預充填注射針筒)



免冷凍。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15