

用藥指導單張

衛教小組 DL15320101

學名：Duloxetine

商品名：duloxetine 30mg(低劑量)

中文名：萬憂停膠囊



一、此藥品的用途是什麼？

重鬱症、廣泛性焦慮症、糖尿病周邊神經痛、纖維肌痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

Duloxetine一般為一天服用一次，不需考慮進食與否。Duloxetine應整粒吞服；不可壓碎、咀嚼亦不可打開膠囊。

治療重鬱症之劑量

Duloxetine 的每日建議劑量為40mg (20mg 一天二次)至60mg (60mg 一天一次或30mg 一天二次)。有些病患可能必須以30mg 一天一次開始治療一個星期，可讓病患在提高劑量至60mg 一天一次以前適應藥品。

治療廣泛性焦慮症之劑量

成人——於開始治療的第一週以30mg 一天一次給藥，病患得以在劑量調高至60mg 一天一次以前適應本品。雖然120mg 一天一次的劑量也顯示療效，尚未證實每日劑量大於60mg 有額外的臨床效益。因此，若決定增加劑量至超過60mg 一天一次，應以每天30mg 的增加量緩慢增加劑量。使用劑量超過120mg 一天一次的安全性尚未被充分的評估。

老人——

Duloxetine 起始劑量為30mg 一天一次，兩星期後再考慮調升至目標劑量60mg。之後，病患或許會受益於每日一次大於60mg 之劑

量。若決定調升每日一次的劑量至超過 60mg，則應以 30mg 每日一次的增加量調整。經過研究每日最大量為120mg。使用劑量超過一

天一次120mg 的安全性尚未被充分的評估。定期重複評估以決定是否需要繼續維持治療及其適當的治療劑量。

孩童及青少年(年齡7 至17 歲)——

Duloxetine 起始劑量為30mg 一天一次，兩星期後再考慮調升至60mg。建議劑量範圍為30mg 至60mg 一天一次。有些病患或許會受益於每日一次大於60mg 之劑量。若決定調升每日一次的劑量至超過60mg，則應以30mg 每日一次的增加量調整。經過研究每日最大劑量為20mg。使用劑量超過一天一次120mg 的安全性尚未被充分的評估。定期重複評估以決定是否需要繼續維持治療及其適當的治療劑量。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL15320101

學名：Duloxetine

商品名：duxetine 30mg(低劑量)

中文名：萬憂停膠囊



治療糖尿病周邊神經痛之劑量

投與Duloxetine 的每日建議劑量為60mg 一天一次。

尚未證實每日劑量大於60mg 可表現更多顯著的臨床效益，且病患對高劑量的耐受性明顯較低。

對於耐受性可能較差的病患，應考慮使用較低的起始劑量。糖尿病經常併發腎臟疾病，因此對於伴有腎功能不全的病患，應考慮投

予較低起始劑量，再逐漸增加治療劑量。

治療纖維肌痛之劑量

投與Duloxetine 60 mg 一天一次。應以30mg 一天一次開始治療一個星期，可以讓病患在提高劑量至60mg 一天一次以前適應藥品。

有些病患可能對起始劑量產生反應。即使是對60mg 沒有治療反應的病患，沒有證據顯示劑量大於一天60 mg 可以帶來更多的臨

床效益，且較高的劑量與較高的不良反應發生率有關。

三、使用時我該注意的特別事項？

自殺：監測病況惡化或自殺風險。

肝毒性：有肝衰竭，其中有些致死的案例發生於以DUXETINE治療的病患中。當病患產生黃疸或有證據顯示產生臨床上明顯的肝功能障礙，應該停止DUXETINE的治療直到確認造成上述疾病的其他因素才可再度使用DUXETINE。DUXETINE不應用於治療大量使用酒精的病患或慢性肝病病患。

姿勢性低血壓及暈厥：曾有病患服用本藥發生姿勢性低血壓及暈厥的報告。

胃排空速度慢的病患：應小心謹慎地使用本藥治療這些病患。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DL15320101

學名：Duloxetine

商品名：duxetine 30mg(低劑量)

中文名：萬憂停膠囊



五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗。

六、此藥儲存時的條件為何？

一般儲存於30℃以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師