用藥指導單張

衛教小組 DM8190201

學　名：Tigecycline

商品名：TYGACIL(老虎黴素)50MG

中文名：老虎黴素凍晶注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

對Tigecycline具有感受性之細菌所引起之複雜性皮膚及皮膚結構感染或複雜性腹腔內感染症。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
初始劑量為 100mg靜脈注射，然後50mg每12小時一次，使用5~14天。

三、使用時我該注意的特別事項？

不建議使用於18歲以下之患者。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：　在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見的副作用有噁心、嘔吐、腹瀉。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.25