用藥指導單張

衛教小組 DE2510601

學　名：dapagliflozin

商品名：FORXIGA 10MG

中文名：福適佳膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

1. 第二型糖尿病

- 血糖控制：配合飲食和運動，以改善第二型糖尿病成人病人的血糖控制。
- 預防心血管事件：用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病（CVD）或多重心血管風險因子的成人病人時，可降低心衰竭住院的風險。
- 預防腎臟病：降低慢性腎臟病（CKD）新發生或惡化的風險。

2. 慢性腎臟病

用於治療有惡化風險之慢性腎臟病的成人病人時，可降低持續性腎絲球過濾率（eGFR）下降、末期腎病（ESKD）、心衰竭住院和心血管死亡的風險。

3. 心衰竭

用於心衰竭的成人病人時，可降低心血管死亡、心衰竭住院和心衰竭緊急就醫的風險。

4. 使用限制

- 不建議Forxiga用於第一型糖尿病病人，其可能增加這群病人糖尿病酮酸中毒之風險。

  不建議使用Forxiga作為eGFR低於45 mL/min/1.73 m2的第二型糖尿病病人的血糖控制，Forxiga基於其作用機制，在此情況下可能無效。

- 不建議使用Forxiga用於治療多囊性腎臟病病人，或慢性腎臟病病人其病情需要或近期曾接受免疫抑制療法治療。Forxiga預計不會對這些病人族群有效。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

衛教小組 DE2510601

學　名：dapagliflozin

商品名：FORXIGA 10MG

中文名：福適佳膜衣錠



二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

開始使　Forxiga前

在開始Forxiga治療前應評估腎功能，之後依臨床需要進　評估　。

對於　容量不　的病　，應於在開始Forxiga治療前應評估　容量狀態，必要時應矯正　容量不　的情形。

依照腎絲球過濾率（eGFR）的建議劑量

eGFR 45或以上之建議劑量為　：

•改善　糖控制，Forxiga的建議起始劑量是5毫克每天　服1次。在耐受Forxiga 5毫克每天1次的病　，需要對於額外　糖控制時，劑量可增　10毫克每天　服1次。*

• 對於所有其他適應症的建議起始劑量是每天　服1次10毫克。

eGFR 25　　於45之建議劑量為　：

• 每天　服1次10毫克。*

eGFR　於25之建議劑量為　：

針對此類病　不建議開始治療，然　Forxiga治療後，eGFR降低　　於25mL/min/1.73 m2的病　，可持續使　以降低eGFR下降、ESKD、　　管死亡和　衰竭住院的風險。

三、使用時我該注意的特別事項？

血容量不

Forxiga可導致　管內容積減少，有時可能引起症狀性低　壓或肌酸酐急性短暫變化。曾有上市後報告指出，接受SGLT2抑制劑（包含Forxiga）治療的第　型糖尿病病　發　急性腎損傷，部分案例需要住院及透析。腎功能不全的病　（eGFR　於60 mL/min/1.73 m2）、老年病　或使　環利尿劑（loop diuretics）的病　，發　　容量不　或低　壓的風險可能增加。當病　有上述任　種特徵時，應在開始

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09

用藥指導單張

衛教小組 DE2510601

學　名：dapagliflozin

商品名：FORXIGA 10MG

中文名：福適佳膜衣錠



使　Forxiga前，評估　容量狀態和腎功能，並在開始治療後持續監測低　壓的徵象和症狀與腎功能。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

生殖器黴菌感染、鼻咽炎、尿路感染、背痛、排尿增加。

六、此藥儲存時的條件為何？

儲存於30° C以下。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.09