用藥指導單張

衛教小組 DJ9100201

學　名：BCG vaccine

商品名：B.C.G(公費)

中文名：凍結乾燥卡介苗



一、此藥品的用途是什麼？

預防結核病。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 0.1ml 左上臂三角肌中央皮內。
2. 新生兒：出生二十四小時，體重2500gm以上即可接種。
3. 早產兒：最好在出生半年後，健康情況良好再給予接種，如在半年內體重超過2500gm，經醫師健檢查發育正常者，依醫囑接種。
4. 國小兒童：一年級兒童----檢查無卡介苗疤痕者，給予結核菌素測驗，反應陰性者接種卡介苗。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 每安瓿一經打開復原後立即使用，必須二小時內用完，並防曝光。
2. 稀釋液亦應低溫保存，因其溫度若超過25℃易使疫苗凝集及力價降低。
3. 接種當日及次日應避免劇烈運動，接種部位及周圍應保持清潔避免摩擦及沾濕。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

請諮詢醫師或藥師

五、此藥會造成什麼副作用？

卡介苗接種後的正常反應是在七至十四天後，注射部位呈現出小紅結節。之後，結節逐漸長大，但不會發燒，局部略有痛癢，四至六週後可變成膿泡或潰爛，此時不可擠壓，不必擦藥或包紮，只需保持清潔，若有膿流出時，可用無菌棉花或紗布拭除。待二至三個月間，潰爛會自行癒合，留有一微紅的疤。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 2 ~ 8 度冰箱內(勿冷凍)；如發生變質或過期，不可再使用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15