

用藥指導單張

衛教小組 DQ7050101

學名：Bendamustine

商品名：INNOMUSTINE ★ 100MG (健保事審)

中文名：普癌汰乾粉靜脈注射劑



一、此藥品的用途是什麼？

1. Binet分類stageB及C之慢性淋巴球白血病(chronic lymphocytic leukemia, CLL)。
2. 曾接受至少一種化療之和緩性非何杰金氏淋巴瘤，六個月內曾以 rituximab治療失敗之單一治療。
3. Bendamustine合併Rituximab適用於先前未曾接受治療的CD20陽性、第 III/IV 期和緩性非何杰金氏淋巴瘤(non-hodgkin lymphoma, NHL)。Bendamustine合併Rituximab適用於先前未曾接受治療且不適合自體幹細胞移植的第 III/IV 期被套細胞淋巴瘤(mantle cell lymphoma, MCL)。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

單一療法用於慢性淋巴球白血病(CLL)

建議劑量

在28天的週期，第1和2天以30分鐘靜脈輸注給予100 mg/m²，達6個週期。

單一療法用於rituximab治療失敗的和緩性非何杰金氏淋巴瘤(NHL)

建議劑量

在21天週期中，第1和2天以60分鐘靜脈輸注給予120 mg/m²，達8個週期。

合併Rituximab用於一線治療非何杰金氏淋巴瘤(non-hodgkin lymphoma, NHL)及被套細胞淋巴瘤(mantle cell lymphoma, MCL)

建議劑量

在28天的週期，第1和2天以靜脈輸注給予 90 mg/m²，達6個週期。

給藥

Innomustine是以靜脈輸注 30 - 60分鐘之方式投予。

注射瓶僅供單次使用。任何未使用的產品或廢棄物應依據當地法規丟棄。

三、使用時我該注意的特別事項？

骨髓抑制

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DQ7050101

學名：Bendamustine

商品名：INNOMUSTINE ★ 100MG (健保事審)

中文名：普癌汰乾粉靜脈注射劑



以Innomustine治療的病患可能發生骨髓抑制。兩個NHL臨床試驗結果顯示98%的病患出現第3 - 4級的骨髓抑制（見表4），3個病患（2%）因骨髓抑制相關之不良反應導致死亡：分別是嗜中性白血球減少性敗血症（neutropenic sepsis）、瀰漫性肺泡出血（diffuse alveolar hemorrhage）併第3級血小板減少（thrombocytopenia）和伺機性感肺炎（巨細胞病毒，CMV）。

治療相關的骨髓抑制事件中，嚴密監測白血球、血小板、紅血球（Hgb）和嗜中性白血球。臨床試驗初期，每週皆須監測血液指數。血液指數最低點（hematologic nadirs）多發生於治療的第3週，血液指數最低點的情況若於下一個週期的第1天尚未恢復至建議值，則可能需要延遲給藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

D 級：在對照的人體研究試驗中顯示該藥物對胚胎有不良影響，若此藥能帶來之效益遠超過其它藥物的使用，因此即使在其危險性的存在下，仍可接受此藥物用於懷孕婦女上。

五、此藥會造成什麼副作用？

噁心、疲勞、嘔吐、腹瀉、發燒、骨髓抑制及皮疹。

六、此藥儲存時的條件為何？

勿儲存於25°C以上。

請將瓶身保存於盒內以避光。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師