

用藥指導單張

衛教小組 DC5230201

學名：Oxcarbazepine

商品名：triLEPTAL 懸液劑 60MG/ML, 100ML

中文名：除癲達 6 %口服懸浮液



一、此藥品的用途是什麼？

成人局部癲癇發作之單一或輔助治療，大於一個月孩童癲癇局部發作之輔助治療。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

1. 成人：initially, 600mg/day in 2 divided dose, up to 2400mg/day.
2. 小孩：initially, 8-10mg/kg/day in 2 divided dose, Max 60mg/kg/day.

三、使用時我該注意的特別事項？

服用本品，應告知患者，操作機械或駕駛車輛的生理及/或精神能力會受到影響而減弱。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

常見的副作用((10%)：疲勞、眩暈、頭痛、嗜睡、噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

室溫儲藏。開封後可保存7週。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師