

用藥指導單張

衛教小組 DC15690101

學名：Fentanyl

商品名：Fentanyl (貼片) ★ 50MCG/HR (高劑量) (管藥二)

中文名：吩坦尼穿皮貼片劑50微公克/小時



一、此藥品的用途是什麼？

需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

起始劑量的選擇

吩坦尼穿皮貼片劑起始劑量的選擇須依據病患目前的類鴉片藥物使用情形。建議吩坦尼穿皮貼片劑用於已出現類鴉片藥物耐受性的病人。而其它須考慮的因素包括病人目前的健康情況及用藥狀況(包括體型、年齡及虛弱程度和對類鴉片藥物的耐受程度)。

成人

對類鴉片藥物有耐受性的病人

類鴉片藥物的耐受者由口服或靜脈注射之類鴉片藥物轉換成吩坦尼穿皮貼片劑時，請參考下方的等止痛劑量換算。隨後於必要時，可依病人的反應和補充止痛劑需求往上或往下調整劑量。(以 $12 \mu\text{g/h}$ 或 $25 \mu\text{g/h}$ 的速度增加以達到吩坦尼穿皮貼片劑的最低合適劑量)。

兒童

吩坦尼穿皮貼片劑僅能使用於對類鴉片藥物有耐受性的病童(年齡為 2-16 歲)，該病童須正接受至少相當於每日 30 mg 的口服嗎啡 劑量。

三、使用時我該注意的特別事項？

因為短時間內的使用無法作適當的劑量調整，而且可能會導致嚴重或危及生命的換氣不足，故急性或術後疼痛切勿使用吩坦尼穿皮貼片劑。曾發生嚴重副作用的病患，在吩坦尼穿皮貼片劑移除後，至少應觀察 24 小時，因為 fentanyl 的血中濃度係逐漸下降，約 17 小時後(平均 13-22 小時)才會降至原來的 50%。

不要切割吩坦尼穿皮貼片劑貼片。不應使用曾以任何方式被分割、裁剪或損壞的貼片。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

用藥指導單張

衛教小組 DC15690101

學名：Fentanyl

商品名：Fentanyl (貼片) ★ 50MCG/HR (高劑量) (管藥二)

中文名：盼坦尼穿皮貼片劑50微公克/小時



C 級：在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

血清素症候群(serotonin syndrome)：曾有併用 opioid 類藥品與作用於血清素系統之藥品引起血清素症候群之通報案例。

六、此藥儲存時的條件為何？

密封包裝貯於 25°C 以下。置於未開封之原包裝內。置於兒童無法觸及處。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師