用藥指導單張

衛教小組 DM0250101

學　名：Entecavir

商品名：BARACLUDE 1MG

中文名：貝樂克膜衣錠



一、此藥品的用途是什麼？

治療有B型肝炎病毒複製跡象的成人慢性B型肝炎患者。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：

. 對於未曾接受核苷治療的成人和16歲以上青少年，治療慢性B型肝炎病毒感染的BARACLUDE建議劑量是0.5毫克每日一次。

. 對於在lamivudine治療期間有B型肝炎病毒血症跡象或有lamivudine抗藥性突變的成人和青少年（16歲以上），建議劑量是1毫克每日一次。

三、使用時我該注意的特別事項？

1.腎功能不全：對於肌酸酐廓清率<50 mL/min的患者，包括接受血液透析或CAPD治療中的患者，建議調整Baraclude的劑量。

2.肝臟移植患者：Baraclude用於接受肝臟移植者的安全性與療效不明。對於曾經接受或正在接受可能會影響腎功能的免疫抑制劑（如cyclosporine或tacrolimus）治療的肝臟移植患者，如果需要Baraclude治療，則在開始Baraclude治療之前與治療期間，均應小心監測評估其腎功能。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

C 級：　在對照的動物研究試驗中顯示該藥學物對胚胎有不良反應（致畸胎性或殺胚胎性或其他），但未進行人體懷孕婦女研究；或者尚無對照的人體懷孕婦女或動物研究試驗。只有在可能的利益大於潛在的危險，才可使用此藥物。

五、此藥會造成什麼副作用？

頭痛、疲卷、暈眩、噁心。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.15