用藥指導單張

衛教小組 DD2060101

學　名：Lansoprazole

商品名：TAKEPRON OD 15MG(附報告)

中文名：泰克胃通口溶錠



一、此藥品的用途是什麼？

胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃食道逆流性疾病-糜爛性逆流性食道炎之治療、ZOLLINGER-ELLISON症侯群，合併抗生素治療與幽門螺旋桿菌(HELICOBACTER PYLORI)相關的消化性潰瘍。

二、此藥品該如何使用？

詳細的使用方式請遵從藥袋上用法用量醫師的指示。一般來說這個藥品的使用方式如下：
本品應於餐前服用，成人每天1次，口服lansoprazole 15mg。治療胃潰瘍和逆流性食炎通常須連續服用8週，治療十二指腸潰瘍須連續服用4週。

本品不應嚼食。請將藥錠製其舌上待其分解，可喝水或不喝水，直到顆粒可以吞服。通常藥錠不到一分鐘便會溶解。

三、使用時我該注意的特別事項？

1. 對孕婦或有可能懷孕之婦女，須事先判斷治療上之有益性勝過危險性，始可投與。
2. 本藥品不適合用於正在哺乳中的婦女，如不得已需服藥時，應避免哺乳。
3. 服用時，因為本藥會隱蔽由胃癌所引起之症狀，所以須先確認非惡性胃癌始可給藥。

四、孕婦用藥等級及注意事項？

B 級： 在對照的動物生殖研究試驗中未顯示該藥物有胚胎毒性，但尚無完整的人體懷孕婦女研究試驗資料；或者在動物生殖對照研究試驗中發現該藥物有不良反應（大於降低生育力之反應），但在對照的人體懷孕婦女研究試驗中，未顯示該藥物有胚胎毒性。

五、此藥會造成什麼副作用？

胸痛、便秘、腹瀉、噁心、頭痛。

六、此藥儲存時的條件為何？

藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥處所；如發生變質或過期，不可再食用。

本單張資料僅供參考，如有疑問請諮詢藥師

光田醫療社團法人 光田綜合醫院藥劑部
諮詢電話　向上/沙鹿院區 (04)26625111-1050
大甲院區 (04)26885599-5141
審視日期：2026.11.07

光田醫療社團法人 光田綜合醫院 Kuang Tien General Hospital